

اصول
التحليل الكيمياء

Edwin Lewis
تأليف الدكتور ادوين لويس اسناذ
الكيمياء والطبيعيات
في
المدرسة الكلية

طبع في بيروت سنة ١٨٧٦

فاتحة

في ايضاح الاصطلاحات

قد اردنا قبل الشروع في ذكر كيفية التحليل ان نوضح بعض
الكلمات الاصطلاحية المستعملة في هذا الكتاب

التذويب

قد تعلمنا من الكيمياء العمومية ماهية التذويب وقواعدها فان
اكثر المواد الجامدة اذا وُضِعَتْ في سيال تذوب فيه فالبعض
يذوب في الماء والبعض لا يذوب فيه بل في السيال المحمض
والبعض لا يذوب فيها بل في السيال القلوي فقط وهذه الخاصية
مهمة في التحليل الكمي لان عليها يُبنى تمييز اكثر المركبات بعضها
عن بعض

الرسوب

اذا وُجِدَ عنصرٌ ما مذوّباً في سيال حامض يُفَرَّقُ اذا أُضِيف
الى السيال مادة تتحد مع العنصر مولداً مركباً لا يذوب في سيال
حامض وهذا الفعل ابي ان يتولد في سيال رائق مركب جديد

لا يذوب في السيلال هو ما يُسمى رسوباً. ويُسمى بالمركب الجديد
الذي لا يذوب راسباً

الترشيح

الترشيح هو تفريق راسب عن سيال بواسطة مادة ذات
مسامات. مثلاً اذا صبَّ سيال فيه راسب على ورق نشاش فينفذ
السيال في مسامات الورق اما الجامد فلا ينفذ فيها بل يبقى على
الورق ثم يفرق عن السيال

وإذا وُضع ورق الترشيح في قمع والقمع في قنينة او انبوبة لاستلقاء
السيال يجب ان يكون بين القمع والقنينة فسحة لخروج
الهواء عند دخول السيال كما يري في الشكل. والسيال
الباقى بعد الترشيح يُسمى مرشحاً ولايضاح كيفية الترشيح
انظر وجه ٢٢



التجفيف


اذا أُحي سيال فيه مذوّب يتطير السيال ويبقى الجامد
وتفريق الجامد عن السيال هذا بواسطة الحرارة هو ما يُسمى تجفيفاً
وقد يكون التجفيف باحمااء السيال فقط لتطير بعض الماء

المذوّب منهُ
(RECAP)

جدول آلات التحليل الكيبي

عمليات التحليل الكيبي هي بسيطة جداً ولا تحتاج لاستخدام
آلات كثيرة وهاك جدول جميع ما يقتضي من الآلات للعمليات
المذكورة في هذا الكتاب

انابيب للكشف مع مسحة لتنظيفها يرى شكل الانابيب في



الرسم

حمل للانابيب يُصنع من خشب وينتونه الى الاعلى نتوات
بارزة لاجل وضع الانابيب الفارغة ويُغيب ثقباً مناسبة لاجل
وضع الانابيب المملّنة

قطعة پلاتين لتجفيف بعض المواد

شريط پلاتين يُستخدم لنقل مادة الى اللهب للكشف عنها

عدة فلينات جيدة مناسبة لتحكيم السد

اقناع زجاج

صحون صينية صغيرة لتجفيف السائلات والرواسب

قضيب زجاج لتحريك السائلات المحبضة

هاون صغير مع مدقة

ورق ترشح

قنينة ترُكَّب كما في الرسم لاجل غسل الرواسب القنينة
مسدودة جيداً بقنينة فيها انبوتان احدهما ب تصل من طرفها
الواحد الى اسفل القنينة من داخل وينعكف طرفها الاخر على
زاوية حادة. والآخرى ت يدخل طرفها الواحد



ايضاً الى داخل القنينة قليلاً وينعكف الاخر على
زاوية منفرجة فاذا نُفِخ في انبوتات ينتج ضغط على
سطح الماء ويسبب خروجه من الانبوتة ب
فبواسطة هذه الآلة يقدر المحلل على غسل الرواسب
في المرشحة بدون تفریط في الماء

فنديل كحولي (يرى شكله في الرسم) ويجب ان يكون له غطاء

محكم (ا) يسدّه في غير مدة العمل لكي لا يتطير منه



الكحول فيبقى ماء الكحول في القنينة ويمنع الاشتعال
على انه يصح استعمال غير هذا الفنديل لاجل التحليل
وانما هذا النوع هو الافوق لسبب نقاوة اللهب وشدة
الحجارة


قنينة لاستحضار الهيدروجين المكبرة (يرى شكلها على وجه ٤٢)

بوري اعنيادي ويرى شكله وكيفية العمل به بند ١٠٠ في اول

جدول آلات التحليل الكيبي

عمليات التحليل الكيبي هي بسيطة جداً ولا تحتاج لاستخدام
آلات كثيرة وهاك جدول جميع ما يقتضي من الآلات للعمليات
المذكورة في هذا الكتاب

انابيب للكشف مع مسحة لتنظيفها برى شكل الانابيب في



الرسم

حمل للانابيب يصنع من خشب ويتو منهُ الى الاعلى نتوات
بارزة لاجل وضع الانابيب الفارغة ويُنقَب ثقوباً مناسبة لاجل
وضع الانابيب المملّانة

قطعة بلايتين لتجفيف بعض المواد

شريط بلايتين يُستخدم لنقل مادة الى اللهب للكشف عنها

عدة فليينات جيدة مناسبة لتحكيم السد

اقناع زجاج


صحنون صينية صغيرة لتجفيف السائلات والرواسب

قضيب زجاج لتحريك السائلات المحبضة

هاون صغير مع مدقة

ورق ترشح

قنينة تركب كما في الرسم لاجل غسل الرواسب القنينة
مسدودة جيداً بقنينة فيها انبوتان احدهما ب تصل من طرفها
الواحد الى اسفل القنينة من داخل وينعكف طرفها الاخر على



زاوية حادة. والاخرى ت يدخل طرفها الواحد
ايضاً الى داخل القنينة قليلاً وينعكف الاخر على
زاوية منفرجة فاذا نُفخ في انبوتية ت ينتج ضغط على
سطح الماء ويسبب خروجه من الانبوتية ب
فبواسطة هذه الآلة يقدر المحلل على غسل الرواسب
في المرشحة بدون تفریط في الماء

فنديل كحولي (يرى شكله في الرسم) ويجب ان يكون له غطاء

محكم (ا) يسد به في غير مدة العمل لكي لا يتطير منه



الكحول فيبقى ماء الكحول في القنينة. ويمنع الاشتعال
على انه يصح استعمال غير هذا الفنديل لاجل التحليل
وانما هذا النوع هو الافوق لسبب نقاوة اللهب وشدة

الحرارة

قنينة لاستحضار الهيدروجين المكبرة (يرى شكلها على وجه ٤٢)

بورى اعنيادي ويرى شكله وكيفية العمل به بند ١٠٠ في اول

القسم الثالث من هذا الكتاب

ملقط نحاس او حديد وعند طرفه (ا ب) عند النقطة التي
يمسك بها (ا) قطعة بلايتين ليمسك بها المادة المراد فحصها بالبوري



ورق اللتموس


فيرى ان هذه الآلات التي تقدم شرحها بسيطة جداً ويمكن
ان يعاض عنها بما يقوم مقامها من آلاتٍ اخرى بسيطة ان اقتضى
الحال فتجفف احياناً مادة تحت فحص على قطعة زجاج مثلاً
عوضاً عن بلايتين على قنديل زيتي عوضاً عن الكحولي وقس عليه

جدول عام لاشهر الكواشف المستخدمة في التحليل الكيبي

الماء

في كل المعاملات الكيبي التي يُستخدَم فيها الماء يجب ان
يكون صرفاً . غير انه لا يوجد في الطبيعة صرفاً . اما ماء المطر
ففيه هو الاكروي وغازاتٍ اخر من الغازات المتفرقة في الهواء وفيه
احياناً حامض نيتريك اما مياه الينابيع ففيها مواد معدنية مختلفة
وغاز الحامض الكربونيك وغير ذلك

والماء يتنقى بالاستقطار اى بتحويله الى بخار بالحرارة ثم اعادته الى الحالة السائلة يبرد وتُستعمل لذلك الآلة المعروفة بالكركة والانبوب او تُستعمل لذلك مع اى وعاء كان لغليان الماء الآلة المرسومة في الشكل المسماة مكثف لبيغ نسبة الى مخترعها فيوصل



بالوعاء الذي يُغلي فيه الماء وعند غليانه يصعد بخاره في الانبوبة ا اما القمع د فيدخل اليه مجرى ماء بارد من وعاء موضوع لذلك فيحيط الانبوبة ويخرج عند ر وهكذا يتحول البخار الى ماء ويقطر من طرف الانبوبة عند ب وبما ان الانبوبة اب هي زجاج تصلح هذه الآلة لاستقطار بعض الحوامض والمواد الطيارة قبل استعمال الماء المستقطر في الاعمال الكيماية بحسب امتحانه لكي يتحقق نقاوته وذاك بهذه الطرق (١) امتحنه بورق اللثوس الازرق والمحمر لثلاث تكون فيه مادة قلوبية او حامضة (٢) جنف قليلا منه على قطعة پلائين نظيفة فان كان صرفا لا يبقى على سطح

الپلاتين شي (٣) اضعف اليه قليلاً من ماء الكلس فان كان فيه حامض كربونيك يتعكر بتوليد الكربونات الكلسيك (٤) اضعف اليه قليلاً من الكلوريد الباريك فان كان فيه الكبريتات الكلسيك او قاعدة اخرى مركبة مع حامض كبريتيك يتولد الكبريتات الباريك الايض الذي لا يذوب باضافة حامض نيتريك اليه (٥) اضعف اليه قليلاً من النترات الفضيك فان كان فيه كلوريد ما مثل الكلوريد الصوديك يتكون راسب ايض هو الكلوريد الفضيك لا يذوب في حامض نيتريك بل يذوب في ماء النشادر (٦) اضعف اليه قليلاً من الاكسالات الامونيك فان كان فيه كلس يتعكر بتوليد راسب ايض هو الاكسالات الكلسيك

اما ماء المطر فيصح في الاعمال الكيمية المذكورة في هذا الكتاب اذا لم يجمع في اول انصبايه لامتزاجه حيثئذ بالغازات المتفرقة في الهواء قبل تنقيته بالمطر

حامض هيدروكلوريك

في الكواشف العمومية لا بد من ان يكون هذا الحامض صرفاً واذا ذاك هو عديم اللون وثقله النوعي 1.3 واذا جفف قليل منه على سطح پلاتين لا يبقى شي

على ان الحامض الاعنيادي كثيراً ما يخالطه الحديد والزرنيخ
والحامض الكبريتيك وقد يخالطه الكلور والحامض الكبريتوس
فلذلك يجب على المحلل ان يمتحنه قبل الاستعمال
اولاً خففه بالماء المقطر واضف اليه مذوب الكلوريد
الباريك (كلوريد الباريوم) فاذا تعكر السائل يدل على وجود
الحامض الكبريتيك

ثانياً جففه فاذا اصفر يدل على وجود الحديد فيه اوشبع
قليلاً منه بماء الشادر حتى يصير قلوباً ثم حمضه بحامض خليك
واضف اليه مذوب الفروسيانيد الپوتاسيك (فروسيانيد
الپوتاسيوم) فاذا ازرق يدل على وجود الحديد
ثالثاً يكشف عن الزرنيخ كما سيذكر (انظر بند ٢٨ على
وجه ٦٢)

حامض هيدروكلوريك مخفف

وهو يستحضر بمرج جزء من الحامض الثقيل باربعة اجزاء من
الماء المقطر

حامض نيتريك

ويجب ان يكون هذا الحامض صرفاً ايضاً كسابقه واذا ذاك
يكون ثقله النوعي ١٠١٧ ولا يبقى شيء منه اذا جفف على قطعة

پلاتين . وقد يخالطه حامض هيدروكلوريك وحامض كبريتيك
فيقتضي امتحانه

اولاً خففة بماء مقطر واضف اليه الكلوريد الباريك فاذا
تعكر السبال يدل على وجود الحامض الكبريتيك

ثانياً خففة بماء مقطر واضف اليه مذوب النترات الفضيك
فان تعكر يدل على وجود الحامض الهيدروكلوريك

حامض نيتريك مخفف

وهو يستحضر بمزج الحامض الثقيل باربعة اجزاء من الماء المقطر

ماء الذهب

وهو يستحضر عند الاحتياج بمزج اربعة اجزاء من الحامض

الهيدروكلوريك الثقيل وجزء من الحامض النيتريك الثقيل

الحامض الكبريتيك

يجب ان يكون صرفاً غيرانه كثيراً ما يخالطه زرننج ورمصاص

وحديد وكلسيوم فلا بد من امتحانه

اولاً خفف قليلاً منه باربعة او خمسة اجزاء من الكحول واذا


تعكر يدل على وجود الرصاص او الحديد او الكلسيوم

فيكشف عن الرصاص بسهولة باضافة قليل من الحامض

الهيدروكلوريك اليه وهو في الانبوبة فان تعكر المزيج عند ملامسة
 الحامضين يدل ذلك على وجود الرصاص
 حامض خليك

يجب ان يكون هذا الحامض صرفاً حتى لا يتعكر عند اضافة
 كلوريد الباريوم او نترات الفضة وبعد تشييعه ماء نشادرياً
 واطافة هيدروجين مكبرت لا يتعكر

حامض هيدروكبريتيك (الهيدروجين المكبرت)
 وهو يستحضر على كيفية سنذكر (بند ٢١ على وجه ٤٢) واذا
 احتيج اليه صرفاً يمرُّ الغاز في قنينة ماء لتنقيته قبل استعماله كما يرى
 في الرسم ا القنينة التي فيها الكبريتيد الحديدوس والحامض
 الكبريتيك الخفف ب القنينة التي فيها الماء لتنقية الغاز
 الانبوبة التي يخرج منها الغاز بعد مروره على الماء



ويستخدم الهيدروجين المكبرت في التحليل الكمي اما غازاً باجرائه

في السائل تحت الفحص او مذوباً في الماء كما سيذكر (انظر وجهه ٤٤)
وبما ان المذوب يفسد عند تعرضه للهواء فلا يستحضر منه كمية
زائدة مرة واحدة ويحفظ في قنينة مسدودة سداً محكماً ومقلوبة في
الماء حذراً من دخول الهواء اليها

ماء النشادر

يجب ان يكون عديم اللون ويكشف عن نقاوته بانه اولاً اذا
جفف على قطعة بلاستين لا يبقى باقٍ ثانياً بعد تخفيفه بثلاث اجزاء
من الماء لا يتعكر باضافة ماء الكلس اليه ثالثاً بعد تحميضه بجامض
نيتريك صرف لا يتولد فيه راسب عند اضافة النترات الباريك
او النترات الفضيك رابعاً لا يكتسب لونا عند اجراء الهيدروجين
المكثرت فيه

الهيدروكبريتيد الامونيك

يستحضر باجراء الهيدروجين المكثرت في ماء النشادر الى تشبيعه

الكلوريد الباريك

ذوب جزءاً منه في عشرة اجزاء من الماء المقطر ويجب ان
يكون غير مخلوط بكبريتات
ويجب ان يكون المذوب متعادلاً ولا يتعكر عند اضافة

الهيدروجين المكبرت او الكبريتيد الامونيك اليه وبعد اضافة
الحامض الكبريتيك اليه حتى لا يعود يرسب شي ثم ترشحه يجب
الا يبقى شي ثم بعد تجفيف المرشح على قطعة بلايتين

النترات الباريك

ذوب جزء منه في عشرة اجزاء من الماء المقطر ويجب ألا
يتعكر عند اضافة النترات الفضيكية اليه

ماء الكلس

لاستحضاره اضف ماء مقطرًا الى كلس كاوهز المزيج من حين
الى حين ثم اسكب السبال الراقق واحفظه في قنينة مسدودة جيدًا

الهيدرات الصوديك (صودا كاو)

ولاستحضاره ذوب جزء من الكربونات الصوديك في ٩
اجزاء من الماء واغل المزيج في وعاء حديد حبي ثم اضف اليه من
حين الى حين ماء الكلس (المستحضر باضافة جزء من كلس
كاو الى ٢ اجزاء من ماء غالي) حتى لا يعود يفور اذا امتحن قليل
منه بحامض هيدروكلوريك. ثم ارفعه عن النار وضعه جانبًا الى
ان يروق واسكب السبال بلطف وجففه حتى يكون ثقلة النوعي
نحو ١٥١٠ واحفظه في قنينة مسدودة جيدًا

التسمية الكيمية المستعملة في هذا الكتاب

اولاً تسمية العناصر ابي المواد البسيطة

١ اذا كان للمادة البسيطة اسم معروف عند العامة سُميت به مثال ذلك حديد ونحاس

٢ اذا كانت المادة معدناً وحديثة الاكتشاف سُميت باسم صفة خاصة بها نحو كلور (من $\chi\lambda\omega\rho\sigma$ معناه اخضر) ويود (من $\omega\delta\eta\sigma$ معناه بنفسجي) وهيدروجين (من $\upsilon\delta\omega\rho$ و $\gamma\epsilon\nu\nu\alpha\omega$ معناه مولد الماء)

٣ اذا كانت المادة معدناً وحديثة الاكتشاف انتهى اسمها بالحرفين وم نحو صوديوم وپوتاسيوم

ثانياً. تسمية المركبات من عنصرين

تتولد المركبات من عنصرين غالباً بانحداد مادة معدنية مع اخرى غير معدنية وتسمى كما ياتي

١. ينتهي اسم المادة غير المعدنية بالحرفين يد ويستعمل في العبارة الكيمية موصوفاً. وينتهي اسم المادة المعدنية بالحرفين يك ويستعمل في العبارة الكيمية صفةً مثال ذلك

مركبات فيها نسي	مثال ذلك	اسمها السابق
أكسجين	الأكسيد الزنكيك	أكسيد الزنك
كلور	الكلوريد الفضيك	كلوريد الفضة
يود	اليود اليوتاسييك	يوديد اليوتاسيوم

وقس عايد

٢. اذا كان للمادة المعدنية مركبان حاصلان من اتحادها مع الأكسجين او الكلور او اليود او الكبريت فالذي فيه الاقل من الأكسجين او الكلور او اليود او الكبريت ينتهي اسمه بالحرفين وس والذي فيه الاكثر بالحرفين يك. فان للنحاس أكسيدان الأكسيد النحاسوس والأكسيد النحاسييك

٣. واذا كان لعنصرين مركبات عديدة واختلفت فيها نسبتها بعضها الى بعض تصدرا اسم كل من العنصرين بلفظة تدل على عدد جواهر ذلك العنصر في كل كتيبة من المركب نحو ثاني لجوهرين وثالث لثلاثة جواهر وهلم جرا. فان للحديد مثلاً ثلث مركبات مع الكبريت الكبريتيد الحديدوس (ح ك) والكبريتيد الحديديك او الثالث كبريتيد الثاني حديدك (ح ك ٢) والثاني كبريتيد الحديديك (ح ك ٢)

ثالثاً. تسمية الحوامض

١. ان أكسيد المواد غير المعدنية تضاد أكاسيد المواد المعدنية مضادة كمية وتختلف عنها اخلافاً كلياً لانها تذوب في الماء على الغالب مولدة سيالاً اذا طعم حامض يجمر مذوب اللطوس الازرق بغثة. ويسمى كل أكسيد من هذا القبيل انهدريد من av بلا vōp ماء فهو عبارة عن أكسيد يتركب مع الماء فيولد حامضاً او مع معدن فيولد ملحاً. وكما تنتهي صفة الاكاسيد التي فيها الاقل من الاكسجين بلفظة وس والتي فيها اكثر بلفظة يك هكذا تنتهي صفة الانهدريدات بلفظة وس ويك ايضاً حسب مقتضى الحال نحو الانهدريد الكبريتوس (الحامض الكبريتوس غير الهيدراتي) والانهدريد الكبريتيك (الحامض الكبريتيك غير الهيدراتي) والانهدريد الكربونيك (غاز الحامض الكربونيك).

قد سبق ان الانهدريد اذا تتركب مع معدن ولد ملحاً نحو الكربونات الكلتيك وهو مركب من الانهدريد الكربونيك والكلسيوم واما اذا تتركب مع الماء فولد حامضاً نحو الحامض الكبريتوس (الحامض الكبريتوس الهيدراتي) وهو الحاصل من اتحاد الانهدريد الكبريتوس مع الماء والحامض الكبريتيك (الحامض الكبريتيك الهيدراتي) وهو الحاصل من اتحاد الانهدريد

الكبريتيك مع الماء ابي الانهيدريد الذي يوصف بلفظة وس
يولد حامضاً يوصف بلفظة وس وكذلك الانهيدريد الذي ينتهي
اسمه في يك. ثم اذا كُثِفَ حامض فيه اكسجين اقل مما في الحامض
المنتج في وس تصدر بلفظة اعلى . مثلاً للكوراربع حوامض
الحامض التحت كلوروس (كل ا) والكوروس (كل ا م)
والكلوريك (كل ا م) والاعلى كلوريك (كل ا ء)

رابعاً تسمية الاملاح

الملح ما حصل عن فعل الحوامض والمعادن بعضها ببعض
او عن فعل الانهيدريد والمعدن ببعضها . وكان يزعم قبلاً ان
الملح حاصل عن اتحاد حامض مع اكسيد معدن غير انه اذ حصل
من ذلك التباس وابهام انعكف الكيميون على اكتشاف طريقة
بها تسمى الاملاح تسمية مضبوطة فاوجدوا ما ياتي بيانه

١ . اذا تولد الملح بفعل حامض او انهيدريد ومعدن بعضها
ببعض كُتِبَ الحامض او الانهيدريد موصوفاً ينتهي في ات اذ
انتهى اسمه في يك وفي يت اذ انتهى في وس والمعدن صفة له نحو
النترات الصوديك والكاربونات الكلسيك والنيترت
الپوتاسيك . ثم اذا كان للمعدن اكسيدان يتركبان مع حامض
ينتهي اسم الاكسيد الذي فيه الاقل من الاكسجين في وس والذي

فيه الاكثر في يك مثاله ان الحديد اكسيدان يتركبان مع الحامض
الكبريتيك وها الاكسيد الحديدوس هو الاكسيد الحديديك
فيولدا الكبريتات الحديدوس (المولد من فعل الحامض
الكبريتيك في الاكسيد الاول) والكبريتات الحديديك (المولد
من فعل الحامض في اكسيد الحديد الاعلى

وبالاجمال نقول ان في كل مركب يوتق اولاً بالمادة غير
المعدنية او بالحامض حسب مقتضى الحال موصوفاً مصدرًا
باللفظة التي تدل على سببه في المركب ومنتهياً في يد اذا كان
غير معدن وفي ات او بت اذا كان حامضاً ثم يوتق بعد ذلك
بالمادة المعدنية صفة له ووصوف مصدره بلفظة تدل على نسبتها
(اي كمية عناصرها) ومنتهياً في يك او وس حسب ما يكون
اكسيد المعدن من الاكسيد الاعلى او الاولى . واعلم انه يقتضى
لتسمية المركبات تسمية كهذه ان يعرف تركيب تلك المركبات وكمية
عناصرها ونسبتها بعضها الى بعض ومن ثم يعين اسمها ويمكن
لمن اطالع على اسمها فقط ان يعرف كيفية تركيبها وكمية عناصرها
تماماً

المقدمة

ماهية التحليل الكمي

(١) ان التحليل الكمي على قسمين كيمي وكلي اما الكمي فهو ما يكشف عن العناصر الموجودة في مادة ما وكيفية تركيبها بعضها مع البعض

واما الكمي فيكشف عن كمية كل عنصر من العناصر الموجودة في المادة تحت الفحص فالتحليل الكمي التقدم على التحليل الكمي لانه لا بد من الكشف عن ماهية العناصر قبل الكشف عن كميته غير ان الكمي قد يكون كميًا ايضًا كما لو وجدنا بالكيمي ان المادة تحت الفحص هي مركبة من الكلور والصوديوم اي الكلوريد الصوديك (ملح الطعام) فمن معرفة نسبة الكلور والصوديوم الواحد الى الاخر في هذا المركب نعرف مقدار كل من العنصرين المذكورين بمجرد معرفة المركب

العناصر التي تكشف عنها في هذا الكتاب

(٢) لا يخفى ان عدد العناصر (المواد البسيطة) هي اكثر من ستين غير ان اشهرها سبعة وثلاثون عنصراً قد اتخذناها موضوعاً في هذا الكتاب وهي

من المواد غير المعدنية

وزن جوهري	سمة	اسماء العناصر
١	هـ	هيدروجين
١٦	ا	أكسجين
١٤	ن	نيتروجين
٣٢	ك	كبريت
١٢	كر	كربون
٣٥.٥	كل	كلور
٣١	ف	فسفور
١٩	فل	فلور
٨٠	ب	بروم
١٢٧	ي	يود
١٠.٤٩	بو	بور
٢٨	س	سليكون
ومن المواد المعدنية		
٢٠.٧	رص	رصاص
١٠.٨	فض	فضة
٢٠٠	زي	زئبق

٢١٠	بز	بزموت
٦٣ ^{٤٥}	نخ	نحاس
١١٢	كد	كدميوم
١٩٦ ^{٢٦}	ذ	ذهب
١٩٧ ^{٢١}	پلا	پلاتين
٧٥	زر	زرنج
١٢٢	انت	انتمون
١١١	ق	قصدیر
٥٢ ^{٤٥}	كرو	كروم
٥٦	ح	حدید
٢٧ ^{٤٥}	ال	الومینوم
٦٥	زن	زنك
٥٩	كو	كوبلت
٥٩	نك	نكل
٥٥	من	منغنيس
٢٤ ^{٢٣}	م	مغنيسيوم
١٢٧	با	باريوم
٨٧ ^{٤٥}	صت	سترون튬يوم

٤٥	كلس	كلسيوم
٢٢	ص	صوديوم
٢٩٢١	پ	پوتاسيوم
١٨	ن ٤٥	امونيوم

اما طريقة الكشف عما بقي من هذه العناصر ستاتي في الكلام عن السبعة والثلاثين عنصراً عند ما تدعو الاحوال لذلك على ان بعضها نادر الوجود بهذا المقدار حتى يكاد يكون عديم الفائدة بالكلية الا للكيمي المتصر على الصناعة فلذلك قد عدلنا عن ذكرها وقبل الشروع في درس هذا الفن لابد للطالب من درس الكيمياء العمومية فهذا الفن هو لمن قد عرف حقيقة العناصر ومركباتها المهمة والقوانين العمومية للتغيرات الكيمية اما الات التحليل الكيفي وعملياته فقليلة بسيطة غير انه لابد من النظافة والتدبير في العمل والانتباه التام لادق التفاصيل. ومن المستحسنات التي يجب ملاحظتها هو ان الطالب يكتب العمليات الكيمية بعبارات مختصرة تدل على كيفية التحليل والتركيب كما يشاهد ذلك في كتاب الكيمياء

(٢) ومع ان موضوع هذا الفن الكشف عن العناصر في كل مركب لا يمكننا الا في بعض الاحوال ان نفرز كل عنصر

على حدته فنعرفة جلياً فالعنصر يُعرف غالباً من بعض مركباته
المعروفة التي يدل ظاهرها على وجود هذا العنصر فيها كالكلمة
المكتوبة مثلاً فان ظاهرها يدل على جميع الاحرف المركبة منها
فاذا وجد الكبريتات الرصاصيك مثلاً بعد تحليل مركب ما
يتأكد لنا وجود الكبريت في ذلك المركب بشرط ان الكبريت لم
يدخله من وسائط التحليل ايضاً اذا بقي الاكسيد الحديدك
بعد استعمال عدة من العمليات ولم يكن دخل للحديد في الكواشف
يستنتج ان الحديد في المركب الاصلى ويؤكد ذلك كما لو كان
الموجود حديداً صرفاً واذا كانت معرفة وجود عنصر ما تثوقف
على معرفة مركباته كان لا بد لنا من ان نعرف تلك المركبات
وظواهرها وصفاتها واعمالها في غيرها. ان بعض المواد المركبة
تُعرف من اول وهلة عند الكيمى ومنها نقدر ان نعرف وجود
عناصرها. اما غاية المحلل فهي ان يستحضر ما يطرح امامه بواسطة
عمليات وجيزة تلك المركبات التي تُعرف عنده من ظواهرها


العمل الاول

رسوب الفضة


(٤) ضع بلورة صغيرة من النترات الفضيكة (نترات الفضة)
في انبوبة وذوّبها في قليل من الماء المقطر واضف للنّوب بعض

نقط الحامض الهيدروكلوريك المخفف وهز الانبوبة جيداً واصبر حتى يرسب الراسب الناتج ثم اضع للمذوب نقطة واحدة من الحامض المذكور وان تولد راسب كرر العمل الى ان لا يرسب شي ثم من اضافة الحامض ثم هز الانبوبة جيداً واجلسها على جانب. وخذ قطعة ورق نشاش نحو ثلاثة قراريط مربعة (شكل ١)


شكل ١



شكل ٢




شكل ٢




واطوئها طولاً (شكل ٢) ثم عرضاً (شكل ٢). ثم افتحها على هيئة مخروط بحيث تكون من الجانب الواحد ثلاث طيات ومن

الجانب الاخر طية واحدة كما في شكل ٤. وضعها في قمع وبلها
شكل ٤



بقليل من الماء ثم ضع القمع وما فيه في محل تحته قدح كما يرى
شكل ٥



في شكل ٥
الكس =
المحل ب
= القمع وما
فيه ت =
القدح
الموضوع

تحت المرشحة لاستلقاء السبال المرشح
(تنبيه. ان الرف (ا في الشكل) يعلى او يوطى بواسطة سفينة
ترسم في شكل ٦)

خذ الآن الانبوبة التي فيها الراسب وصب ما فيها في المرشحة
ثم اغسل الانبوبة بماء حتى ينزل كل ما التصق بها مما داخلها
وصب ذلك في المرشحة اغسل الراسب الباقي في المرشحة مرتين او
ثلاث مرات (اي صب عليه وهو في المرشحة الماء المقطر) ثم انزعه
من القمع وجففه بجمارة واطئة وبعد ذلك اقسمه الى قسمين

العمل الثاني


كيفية الكشف عن الكلور

(٥) خذ القسم الاول وامزجه مع قليل من الثاني أكسيد
المنغنوك والحامض الكبريتيك الثقيل وضع المزيج في انبوبة واحم
الانبوبة تدريجاً فيظهر بخار ذولون اخضر مصفر ورائحة الكلور
الخصوصية ولتحقيق وجود الكلور خذ قطعة ورق مبلول بمزيج
اليوديد البوتاسيك (يوديد البوتاسيوم) والنشا والماء وضعها على
فوهة الانبوبة فينجل اليوديد البوتاسيك بالكلور الصاعد ويزرق
النشا بانحاده مع اليود فالراسب اذ ذاك حاو الكلور

كيفية الكشف عن الفضة


(٦) خذ القسم الثاني من الراسب وامزجه جيداً مع مقداره من الكربونات الصوديك الناشف وأجلها بقليل من الماء على هيئة كتلة صغيرة. خذ قطعة من الفحم الاعياديه الجيد واحفر ثقباً صغيراً فيه في سطح على زاوية قائمة للخطوط المستطيلة وضع فيه الكتلة المعدة المذكورة آنفاً واعرضها بضع دقائق على لهيب البوري الداخلي كما يرى في (شكل ٧) اي ضع فوهة البوري خارج اللهب

شكل ٧



وأنفخ عليه نغماً لطيفاً غير منقطع ثم ضع الفحم وما عليه في وسط اللهب بحيث تغطي المادة به (انظر الشكل) فتستخلص الفضة وتظهر على هيئة كرية بيضاء لامعة فيقال لهذا اللهب اللهب المحلّل

خذ الكرية وضعها بواسطة شريط پلاتين في هيب البوري
الخارجي كما في شكل ٨ اي ضع فوهة البوري داخل الهيب وانفخ
شكل ٨



نفخاً شديداً غير منقطع ثم ضع الكرية عند راس الهيب فلانناكسد
(لان الفضة لاناكسد بالحرارة) بل تبقى على هيئة كرية بيضاء لامعة
فتمتاز اذ ذاك عن القصدير الذي يتناكسد به هيب البوري الخارجي
فيقال لهذا الهيب الهيب المؤكسد

قد علمت من العمل الاول ان اضافة الحامض الهيدروكلوريك
للذوب فيه النترات الفضيكة يولد راسب ومن العمل الثاني
والثالث قد تحقق ان الراسب هو الكلوريد الفضيكة الذي
لا يجف ان كلوره من الحامض الهيدروكلوريك وفضته من
النترات الفضيكة وليس في المرشح اي السيل الباقي بعد تفريقه
عن الراسب بالمرشحة شي من الفضة


لذلك قد فرقت الفضة كلها من المذوب بواسطة الكلور في الحامض الهيدروكلوريك اي قد فرقت الفضة المذوبة بتكوين الكلوريد الفضي الذي لا يذوب في سيال حمض لانه اذا جعلت مذوب النترات الفضي فلوياً بواسطة ماء النشادر في العمل الاول لا يرسب شيء من اضافة الحامض ما دام السيل فلوياً ولكن حالما يصير السيل حمضاً بواسطة الحامض المستخدم يرسب الكلوريد الفضي

مثال كتابة عبارة مختصرة تدل على كيفية التحليل

والتركيب

(٧) قد استخدمت في العمل الاول النترات الفضي سيمته فض ن ٢١ والحامض الهيدروكلوريك سيمته ٥ كل وقد وجدت في الراسب المتولد بمزجها الكلوريد الفضي سيمته فض كل. لذلك فض ن ٢١ + ٥ كل = فض كل + ك اما ك = ٥ (الباقى من الحامض الهيدروكلوريك) + ن ٢١ (الباقى من النترات الفضي) فالعبارة المختصرة اذا هي هذه

$$\text{فض ن } ٢١ + ٥ \text{ كل} = \text{فض كل} + \text{ن } ٢١$$



العمل الرابع

كيفية الكشف عن النحاس

(٨) ضع بلورة صغيرة من الكبريتات النحاسية (كبريتات النحاس) في أنبوبة وذوبها في قليل من الماء ملاحظاً لون المذوّب الأزرق لأنّه يُعرّف وجود النحاس أضعف للمذوّب بعض نقط الحامض الهيدروكلوريك المخفف وهز الأنبوبة جيداً فلا يُرسب شيء. بعد تحقق عدم الرسوب من استعمال الحامض المذكور أضعف للزجاج بعض نقط مذوّب الفروسيانيد البوتاسيك (فروسيانيد البوتاسيوم) في رسب راسب أحمر مسمر به يعرف وجود النحاس

العمل الخامس

مثال تفريق عنصريين

(٩) ضع بلورة صغيرة من النترات الفضيّة وأخرى من الكبريتات النحاسية في أنبوبة وذوبها في قليل من الماء وأضعف للمذوّب بعض نقط الحامض الهيدروكلوريك المخفف وهز الأنبوبة جيداً وأصبر حتى يرسب الراسب الناتج عن الحامض ثم أضعف له نقطة واحدة من الحامض الهيدروكلوريك فإن تولد راسب كبر

العمل الى ان لا يرسب شيء من اضافته الحامض فيفرز اذ ذلك
الفضة عن السائل على هيئة راسب هو الانبوبة وصب ما داخلها
في مرشحة فتنجها قدح ثم اغسل الانبوبة بماء حتى ينزل كل ما التصق
بها مما داخلها وصب ذلك في المرشحة فتكون قد فرقت الفضة عن
النحاس. اما الفضة فتوجد في الراسب على هيئة الكلوريد الفضي
كما في العمل الاول ويكشف عنها كما في العمل الثالث ويوجد
النحاس في السائل داخل القدح ويكشف عنه كما في العمل الرابع
فهذا التفريق التام السريع متوقف باجمعه على كون الكلوريد
الفضي لا يذوب في الماء ولا في سيال محبب بخلاف الكلوريد
النحاسي الذي يذوب فيها كما سبق ولذلك حينما اُضيف حامض
هيدروكلوريك للذوب الذي فيه الفضة والنحاس رسب الكلوريد
الفضي على هيئة راسب ابيض واما الاخر فلا يزال مذوباً في
السيال وفرقا عن بعضهما بالمرشحة وفي الغالب عند ما تضاف
مادة لسائل ما من شأنها ان تولد راسباً لا يذوب تفرز عناصر
ذلك الراسب عن السائل

ايضاح تفريق الصف الاول

(١٠) قد تقدم معنا عمل تفريق عنصرين فقط فلو وجد

لكل عنصر مادة مختصة به ترسبه لكان تفريق العناصر من

السائلات أمراً سهلاً غير ان الامر ليس كذلك فان الحامض الهيدروكلوريك مثلاً الذي يُرسب الفضة كما سبق القول يُرسب عنصرين آخرين ايضاً من الماء او السائل المحمض كالزئبق على هيئة الكلوريد الزيفوس الذي لا يذوب في الماء ولا في السيل المحمض والرصاص على هيئة الكلوريد الرصاصيك الذي لا يذوب في الماء الا قليلاً وكل كلوريد سوى ما سبق ذكره يذوب في الماء والحوامض المستخدمة في التحليل

ان المواد المعدنية الاله التي قد جعلناها موضوعاً للنقص في كتابنا هذا هي خمسة وعشرين كما مرّ ومركباتها فاذا اضفنا كمية كافية من الحامض الهيدروكلوريك للمذوّب المفروض انه مجنوبي على الخمسة والعشرين عنصراً يرسب منها ثلاثة فقط على هيئة كلوريدات وبعد الترشيح والغسل يبقى في الراسب الكلوريدات الفضيك والرصاصيك والزيفوس اما ما بقي من العناصر فيبقى في المذوّب واما الفضة والرصاص والزئبق التي قد فرقناها باستخدام الحامض الهيدروكلوريك فهي الصف الاول من الصفوف المنقسمة اليها العناصر المعدنية

ان لكل صف من الصفوف فاعلاً كيميائياً به تفرق عناصر ذلك الصف عن عناصر الصفوف الأخرى والفاعل لذلك الفعل الكمي

يُسمى الفاعل العمومي لذلك الصف فمن ثم يكون الحامض الهيدروكلوريك فاعلاً عمومياً للصف الأول؛

وتفريق العناصر هذه الى صفوف يجعل تفريق كل عنصر على العناصر الأخر غير ضروري في التحليل القانوني ننتش عن الصفوف ونفرقها بعضها عن بعض ثم نفحص عن كل صف على حدة لتفريق عناصره الخصوصية . وفائدته هي انه عند ما نتأكد عدم وجود صف ما في المادة تحت الفحص لا نحتاج الى الفحص عن العناصر التي تركب منها هذا الصف ولا يلزمنا سوية وقت قصير لذلك لاننا نقدر ان نعرف عدم وجود صف بذات السهولة التي بها نعرف عدم وجود عنصر واحد فقط

تقسيم هذا الكتاب

(١١) ينقسم هذا الكتاب بالنظر الى الفحص عن المواد غير

الالية الى اربعة اقسام

فالتقسيم الاول يوضح كيفية تفريق المواد المعدنية الى صفوف بواسطة الفواعل العمومية وكيفية الكشف بخصوصي عن كل من المواد المعدنية

والتقسيم الثاني يوضح كيفية تفريق المواد غير المعدنية الى صفوف بالفواعل العمومية وكيفية الكشف بخصوصي عن كل منها

والقسم الثالث يوضح كيفية الكشف بالحرارة
والقسم الرابع يوضح كيفية اعداد مادة مجهولة للفحص عنها
وطريقة هذا الفحص

ملاحظات عمومية

(١٢) كثيراً ما يغلط المحلل بعدم مزجه المذوب تحت الفحص مع
الكاشف مزجاً تاماً اذ يتغاضى عن هز الانبوبة بعد اضافة الكاشف
وايضاً ربما يقع غلط بعدم تعديله الكاشف اى باستخدامه كمية زائدة
او ناقصة عن المطلوب فلذلك يجب عليه من بعد ترشيح الراسب
ان يضيف الى المرشح نقطة او نقطتين من الكاشف فاذا رسب
راسب يزيد الكاشف ثم يصب السيل وما فيه في المرشحة وبعد
هذا الترشيح يضيف الى المرشح نقطة اخرى من الكاشف فان
رسب راسب يكرر العمل حتى لا يرسب شيء فحينئذ ان لم يتولد
راسب يكون ما استخدمه كافياً ويجب عليه دائماً الانتباه التام
لغسل الراسب في المرشحة غسلًا جيداً قبل الفحص فيه وذلك بان
يصب عليه وهو في المرشحة من الماء المقطر حتى يري الماء الخارج
منها صافياً. ومع كل هذه الاحتياطات فباطلاً يتعب المحلل
بالوقوف على الحقيقة ان لم تكن الالات المستخدمة نظيفة غاية
النظافة

القسم الاول

في كيفية تفريق المواد المعدنية الى صفوف
وطريقة الكشف عنها

الفصل الاول

في الصف الاول

وهو مركب من مواد معدنية لا تذوب كلوريداتها في
الماء ولا في الحوامض



الفاعل العمومي هو حامض هيدروكلوريك

سببته هكل

كيفية رسوب الرصاص



(١٢) ضع ملعقتين صغيرتين من مذوب النترات الرصاصيك (نترات الرصاص) سيمته رص (ن_٢ا_٢) في انبوبة واضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً مخففاً نقطة بعد نقطة وهز الانبوبة جيداً بعد اضافة كل نقطة حتى لا يعود يرسب راسب

كيفية التحليل والتركيب



صب السيلال هذا في مرشحة واغسل الراسب وصب عليه ماء غالباً حتى يذوب واجمع المذوب في قذح. خذ الماء الغالي المذوب فيه الكلوريد الرصاصيك واضف اليه حامضاً كبريتيكاً مخففاً فيتولد الكبريتات الرصاصيك


كيفية التحليل والتركيب



فيرى ما تقدم ان الرصاص يرسب بحامض هيدروكلوريك على هيئة الكلوريد الرصاصيك الذي يذوب في الماء الغالي ويرسب من هذا المذوب بحامض كبريتيك

كيفية رسوب الفضة

(١٤) ضع ٦ نقط من مذوب النترات الفضيك (نترات الفضة) سيمته فض ن ا م واضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً فيرسب الكلوريد الفضيك



صبه في مرشحة للترشيح وبعد غسل الراسب بالماء البارد صب عليه ماء غالياً فلا يذوب فيما زاد ذاك عن الكلوريد الرصاصيك ثم صب عليه قليلاً من ماء النشادر الخفيف فيذوب فيرى ما تقدم ان الفضة ترسب بواسطة حامض هيدروكلوريك على هيئة الكلوريد الفضيك (كلوريد الفضة) الذي لا يذوب في الماء الغالي بل في ماء النشادر

كيفية رسوب الزئبق

(١٥) ضع ٦ نقط من مذوب النترات الزئبقوس (تحت نترات الزئبق) سيمته زي كل في انبوبة واضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً فيرسب الكلووريد الزئبقوس

كيفية التحليل والتركيب

زي ن_٢ + ه_٥ كل = زي كل + ه_٥ ن_٢

رشحة وبعد غسله صب على الراسب ماءً غالباً ولا يذوب ثم صب عليه ماء النشادر المخفف فلا يذوب بل يتحول الى الامونيوكلووريد الثاني زئبقوس (زي ن_٢ ه_٥ ن كل) وهو اسود في ما يرسب بالحامض الهيدروكلوريك

(١٦) مما تقدم يرى ان الرصاص والفضة والزئبق ترسب من مذوباتها بحامض هيدروكلوريك على هيئة كلوريدات لا تذوب في الماء ولا في السيل المحمض ولا مادة غيرها ترسب على هذه الكيفية وهي اذ ذاك الصف الاول من المواد المعدنية

لذلك اذا رُسب راسب من سيل ما محمض عند استعمال

حامض هيدروكلوريك يتحقق وجود كلٍ من الرصاص والفضة
والزئبق في السيال او بعضها

ثم اذا ذاب هذا الراسب في الماء الغالي فإني السيال من
الصف الاول رصاص فقط

فان لم يذب شي منه فلا رصاص في الراسب
واذا ذاب البعض وبقي البعض الاخر غير ذائب فإني السيال
من الصف الاول رصاص ومادة اخرى

اذا بقي راسب بعد استعمال الماء الغالي صب عليه ماء النشادر
مخففاً فاذا ذاب في السيال فضة واذا لم يذب فلا فضة فيه بل
زئبق

واذا ذاب البعض وبقي البعض الاخر غير ذائب فني السيال
فضة وزئبق

كيفية تفريق مواد الصف الاول

(١٧) ان المواد التي ترسب بواسطة الفاعل العمومي للصف
الاول (حامض هيدروكلوريك) هي رصاص وفضة وزئبق ويتوقف
تفريقها بعضها عن بعض على ثلاث قضايا
اولاً ان الكلوريد الرصاصيك يذوب في الماء الغالي اما

الكلوريد الفضيك والكلوريد الزيقوس فلا يذوبان فيه
 ثانياً ان الكلوريد الفضيك يذوب في ماء النشادر اما
 الكلوريد الزيقوس فلا يذوب فيه
 ثالثاً ان الكلوريد الزيقوس يسود في ماء النشادر
 الكاشف الخاص للرماس هو حامض كبريتيك كما رأينا
 والكاشف الخاص للفضة هو ان كلوريدها يذوب في ماء
 النشادر ويعود يرسب اذا حمض السيل
 والكاشف الخاص للزبيق هو اسوداد الراسب في ماء النشادر
 وعدم ذوبانه فيه

وليتحقق وجود الزبيق خذ الراسب الذي لم يذوب في الماء
 الغالي ولا في ماء النشادر وجففه وامزجه مع قدره من
 الكربونات الصوديك واحمه في انبوبة نظيفة
 فجمع الزبيق المعدني
 على جدران
 الانبوبة

(١٨) تظهر الطريقة السابقة بيانها من هذا الجدول

الفاعل العموي للصف الاول (٥ كل) يولد (ر ص كل ٢)
 و (خض كل ٤) و (ز ي كل) صب على هذه الرواسب وهي في المرشحة
 ماء غالباً

فيذوب ر ص كل ٢ ولا يذوب فض كل وز ي كل اغمرها بماء
 ويتحقق وجوده النشادر واغلبها
 بواسطة الحامض

الكبريتيك الذبي فيذوب فض كل ولا يذوب زي كل
 يولد اسباباً وكبريتات ويتحقق وجوده ويتحقق وجود الزبيق
 الرصاص بالحامض النتريك جفف الراسب

الذي يعود بربسه وامزجه مع الكربونات

الصوديك واحمها في
 انبوبة في تطير الزبيق
 ويجمع على جدران
 الانبوبة

ملاحظات خصوصية

(١٩) قد يتولد راسب في التحليل القانوني بالفاعل العمومي للصف الاول اذا وُجد في السيل تحت الفحص هيبوكبريت ما حتى ولو لم يوجد عنصر من الصف الاول ولا اشكال في ذلك اولاً لانه عند ما يرسب كبريت من الهيبوكبريت بحامض هيدروكلوريك يتولد حامض كبريتوس ايضاً يُعرف من رائحته المعهودة

ثانياً لان الراسب من الكبريت مصفر اللون خلافاً لرواسب مواد الصف الاول التي هي بيضاء وقد يتولد ايضاً من سيل قلوي راسب ايض لزوج هو حامض سليسيك

الاحتمالات اللازمة للفحص عن مواد الصف

الاول

(٢٠) قبل اضافة الحامض الهيدروكلوريك للسيل تحت الفحص يجب على المحلل ان يتحقق هل المدوب محض او متعادلاً

او قلوئي فان كان من الاولين يكفي لتحقيق وجود مادة من الصف
 الاول خمس اوست نقط فقط من الحامض انما اذا كان قلوياً
 فيجب استخدام الحامض ما يكفي لتحييض السيلال
 وعلى كل اذا رسب راسب زد الحامض الى ان لا يعود يرسب
 شي ثم ورش وان لم يرسب راسب يكفي خمس اوست نقط من
 الحامض وذلك لان القصد في حالة كهنه انما هو تحييض السيلال
 فقط

اذا صار فوران عند استعمال الحامض فيدل ذلك على وجود
 حامض كربونيك لارائحة له او على هيدروجين مكبرت ذي رائحة
 شبيهة برائحة البيض الفاسد او على حامض كبريتوس ذي الرائحة
 المعهودة او على سيانوجين ذي رائحة خانقة شبيهة برائحة
 زيت اللوز المر وعلى المحلل ان يتذكر هذه النتائج لانها
 تعينه في استخدام الكواشف الخصوصية
 التي ستذكر في الفحص
 عن المواد غير
 المعدنية


الفصل الثاني

في الصف الثاني

وهو مركب من مواد معدنية لا تنوب كبريتاتها في الماء
ولا في السوائل الحمضة ولا في القلويات

الفاعل العمومي هو هيدروجين مكبرت

سبته ٥٠٠




كيفية استحضار الهيدروجين المكبريت

(٢١) خذ انبوبة او قنينة وضع فيها قطع قليلة من الكبريتيد

الحديدوس (كبريتت الحديد) ثم سد القنينة بقلينة جيدة فيها

شكل ٢



قم واصل الى اسفل القنينة لتضيف بواسطته

الحامض (انظر الشكل) وانبوبة لاجراج الغاز

بها من القنينة ب في الشكل (انظر شكل ٢)

صب في القمع ماء كافياً لغير طرف الانبوبة

الاسفل ثم اضع اليه قليلاً من الحامض

الكبريتيك الثقيل (يضاف الحامض الى

الماء وهو في القنينة لان الحرارة المتولدة من مزجها تعجل في انحلال

الكبريتيد الحديدوس وفي توليد الغاز) وعند نهاية تولد الغاز

صب في القمع قليلاً من الحامض وهكذا يكرر العمل كلما اقتضى

الحال لكي يدوم مجرى الغاز

وطريقة استعمال الغاز المتولد على هذه الكيفية هي ان يدخل

طرف الانبوبة الخارج منها الغاز (ب في الشكل) في السبال تحت

الفحص نحو فير اطين تحت سطحه. وهكذا اجر الغاز في السبال

مدة نحو خمس او عشر دقائق ثم وقف المجرى وحرك السبال واطرد

الهيدروجين المكبرت الزائد بالنفخ فان بقيت رائحته في السبال
مدة دقيقتين يكون ما استعمل كافياً وان لم تبق رائحة يجب تكرار
العمل

ان الافوق في استخدام الهيدروجين المكبرت ان يكون ذلك
خارجاً عن مكان الجلوس او على قرب من شباك ينفذ الى الفضاء
فيدفع الضرر

كيفية استحضار ماء الهيدروجين المكبرت

اجر غاز الهيدروجين المكبرت المستحضر على الكيفية المذكورة
آنفاً في ماء مقطر مدة كافية لتشييعه منه ولكي يتحقق هل تشبع هذا
الماء او لا خذ القنينة التي فيها الماء وسد فوهتها بالابهام وهزها
جيداً فان كان الماء مشبعاً ينفرد بعض الغاز عنه ويسبب ضغطاً
على الابهام نحو الخارج وان لم يكن تشبع يمتص الغاز الذي كان
في اعلى القنينة ويحصل فراغ يشعر به بضغط الابهام نحو الداخل
وبما ان ماء الهيدروجين المكبرت ينحل اذا كُشِف للهواء
فيقتضي حفظه في قنينة ضابطة ولا يُستحضر في وقت واحد الا
القليل منه

وفي استعمال هذا الماء يُضاف قليل منه الى السبال تحت
الفحص فان تولد راسب تزداد الاضافة الى ان لا يعود يرسب شيء

كيفية رسوب الزبيق

(٢٢) خذ قليلاً من مذوب الكلوريد الزبيقيك (السليمانى) سيمته زي كل_٢ واضف اليه نقطاً قليلة من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب

شبع السيال بالتدرج هيدروجيناً مكبرتاً اما بواسطة مجرى غاز منه او بواسطة ماء به فيتولد راسب اصفر او برنقالي او اسمر محمر الذي يسود اخيراً اي بعد تشبع السيال غازاً

كيفية التحليل والتركيب

زي كل_٢ + ه_٢ك = زي ك + ٢(هكل)

{ سلجاني } { هيدروجين مكبرت } { الكبريتيد الزبيقيك } { }

رشح السيال وغسل الراسب في المرشحة جيداً لازالة كل الحامض الهيدروكلوريك ثم خذ هذا الراسب وضعه في صحن صيني وصب عليه ما يغمره من الهيدرات الصوديك (مذوب صودا كاوا) واغله فلا يدوب

خففه بماء ثم رشحه واغسله جيداً وضعه في صحن صيني وصب

عليه ما يغمره من الحامض النيتريك المخفف واغليه مدة دقيقتين او ثلاث محرگا اياه حركة دائمة بقضيب من زجاج وانت تضيف من مدة الى اخره حامضاً نيتريكاً لیسد مسد ما تطير منه فلا يذوب بل يبقى على هيئة راسب ثقيل معتم اللون (غير انه اذا لم يغسل الراسب جيداً وبقي قليل من الحامض الهيدروكلوريك ملتصقاً بالراسب يتولد عند استعمال الحامض النيتريك ماء الذهب من مزج الحامضين واذ ذاك يذوب الزئبق الموجود فتنبه)

الكاشف الخاص للزئبق

(٣٢) خذ الراسب الذي لم يذوب في الحامض النيتريك واغليه في صحن صيني مع ما يغمره من ماء الذهب فيذوب خفف السيل بماء ورشحه اذا اقتضى الامر لتفريق الكبريت الذي يرسب احياناً عند انحلال الكبريتيد واطفء اليه ماء النشادر حتى يكاد يصير السيل قلوياً واذا اتفق استعمال ماء النشادر عرضاً حتى يصير السيل قلوياً فلا بد لذلك من استعمال الحامض النيتريك نقطة فنقطة حتى يحمض السيل قليلاً

ضع في السيل المحمض قطعة صغيرة من شريط النحاس

اللامع فيجمع الزيت المعدني على الشريط بعد مدة وجيزة كغشاء
ايض فضي

نشف الشريط بعد ربع ساعة بورق النشاش وضعة في انبوبة
واحدة فيجمع الزيت المعدني في اعلى الانبوبة

كيفية رسوب الرصاص

(٢٤) خذ نحو ملعقتين صغيرتين من مذوب النيترات
الرصاصيك رص (ن ا ٢) و اضف اليه خمس اوست نقط من
الحامض الهيدروكلوريك ولا يتولد راسب
اضف الى السيال هيدروجينا مكبرتا حتى يشبع السيال
فيتولد راسب محمّر يسود عند تشبع السيال واحيانا يكون اسود
من اصله

كيفية التحليل والتركيبة

رص (ن ا ٢) + ٢ هـ ك = رص ك + ٢ (هـ ن ا ٢)
رشح السيال جيدا وضع الراسب في صحن صيني واغله في ما
بغمره من الهيدرات الصوديك ولا يدوب
خفته بماه ثم رشحه واغل الراسب بما يغمره من الحامض

النيتريك المخفف فيتحول الكبريتيد الرصاصيك الى النترات
الرصاصيك ويدوب مع رسوب الكبريت احياناً جففة قليلاً لطرده
الحامض النيتريك الزائد ورشح السبال لتفريق الكبريت ان وُجد

الكاشف الخاص للرصاص


(٢٥) خفف المرشح بماء واضف اليه قليلاً من الحامض
الكبريتيك المخفف فيرسب الرصاص على هيئة الكبريتات
الرصاصيك بعد مدة

كيفية رسوب البزموت

(٢٦) خذ نصف ملعقة من مذوب الكلوريد البزموثيك
(وهو يستحضر بتذويب تحت نترات البزموت في حامض
هيدروكلوريك) سيمته بز كل - خففه بالماء فيتعكر السبال (وهذا
يدل على وجود البزموت) ثم اضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً
النقطة بعد الاخرى وهز الانبوبة بعد اضافة كل نقطة الى ان
يروق السبال

ثم اضف اليه هيدروجيناً مكبرتاً ما يكفي لتشبع السبال فيتولد
راسب اسود

كيفية التحليل والتركيب



رشح السيال واغسل الراسب جيداً وضعه في صحن صيني
واغله في ما يغمره من الهيدرات الصوديك ولا يذوب
خفف السيال ورشحه واغل الراسب في ما يغمره من الحامض
النتريك المخفف فيتحول الى النترات البزموثيك ويزوب مع
رسوب الكبريت احياناً

جفف السيال قليلاً لطرده الحامض النتريك منه ثم خففه
بماء ورشحه لتفريق الكبريت اذا وجد واضف اليه قليلاً من
الحامض الكبريتيك المخفف واتركه مدة فلا يتولد راسب
اضف الى السيال تدريجاً ماء النشادر المخفف مع تحريك
السيال حركة دائمة حتى تفوح رائحة النشادر فيتولد راسب ايض
لنرج لا يذوب بزيادة ماء النشادر

الكاشف الخاص للبزموث


(٢٧) رشح السيال وذب الراسب وهو في المرشحة باضافة
نقط قليلة من الحامض الهيدروكلوريك الثقيل اليه جفف

المذوب هذا الى ان لا يبقى منه سوى ثلاث اواربع نقط وصيها في انبوبة فيها ماء فيتعكر السبال كما حدث في تخفيف مذوب البزموت في اول الفحص (انظر بند ٢٦)

كيفية رسوب النحاس

(٢٨) خذ قليلاً من مذوب الكبريتات النحاسيك (الشب الازرق سيمته نح ك ا ء) في الماء واطف اليه خمس نقط او ستاً من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب ثم اضف الى السبال هيدروجيناً مكبرتاً ما يكفي لتشيعه فيتولد راسب اسود

كيفية التحليل والتركيب



رشحه واغسل الراسب جيداً واغله في ما يغمره من الهيدرات الصوديك فلا يذوب

خففه بالماء ورشحه واغل الراسب بعد غسله في ما يغمره من الحامض النيتريك فيتحول الكبريتيد النحاسيك الى النيترات النحاسيك ويزوب مع رسوب الكبريت احياناً جفنه لطرد الحامض النيتريك الزائد ورشحه لتفريق الكبريت

ان وُجد ثم اُضف للرشح حامضاً كبيراً نيكاً مخففاً واتركه مدة فلا يتولد راسب ثم اُضف الى السيال ماء النشادر بزيادة فيزرق ويتولد راسب يذوب عند زيادة النشادر


كيفية التحليل والتركيب

نخ (ن ٢) + ٢ (هـ ن ١٥) = نخ ١٥ + ٢ (هـ ن ٤) (ن ٢)

الكاشف الخاص للنحاس

(٢٩) اللون الازرق الجميل الذي نتج بعد استعمال ماء النشادر هو الكاشف الخاص عن النحاس انما اذا كان هذا اللون فاتحاً كما يكون احياناً في التحليل القانوني فاعل السيال واضف اليه في حالة الغليان نقطاً نقطاً من الهيدروكبريتيد الامونيك (وهو يستحضر باجراء مجرى هيدروجين مكبرت في ماء النشادر المخفف حتى يتشبع ويسمته هـ ن ٥ ك) فيتولد راسب اسود ولاجل ثمة رسوب كل النحاس ارفع الانبوبة عن اللهب وهزها جيداً واتركها مدة الى ان يروق سطح السيال قليلاً فاضف اليه اذ ذاك نقطة من الهيدروكبريتيد الامونيك فان تولد راسب زد الكاشف حتى لا يعود يرسب شي ثم وان لم يتولد راسب يدل ذلك على ان النحاس قد رسب جميعه

كيفية التحليل والتركيب



(تنبيه على الغالب يغلى ويهز سيال فيه راسب متفرق عسر

الترشيح لكي يتجمع الراسب ويتسهل الترشيح)

رشح السيال واغل الراسب وضعه في صحن صيني واغله في

حامض كبريتيك مخفف (جزء حامض كبريتيك وخمسة اجزاء

ماء) فلا يدوب

رشحه وذوب الراسب في قليل من حامض نيتريك ثقيل

واجعل السيال هذا قلوباً بماء النشادر ثم حمضه بحامض خليك

وضعه في انبوبة واضف اليه نقطتين او ثلاث نقط من مذوب

الفروسيانيد اليوتاسيك فير سب راسب احمر مسمر هو الفروسيانيد


النحاسيك

كيفية رسوب الكدميوم

(٢٠) خذ مذوب الكلوريد الكدميك واضف اليه خمس

نقط او ستاً من حامض هيدروكلوريك فلا يرسب شيء. اضف

اليه هيدروجيناً مكبرتاً حتى يشبع السيال فيتولد راسب اصفر



رشح السيال واغل الراسب في ما يغمره من الهيدرات الصوديك
فلا يدوب

خففه بالماء ورشحه واغل الراسب في ما يغمره من الحامض
النيتريك المخفف فيدوب مع رسوب الكبريت احياناً
جففه لطرده الحامض النيتريك الزائد ورشحه لتفريق الكبريت
ان وجد واضف الى المرشح حامضاً كبريتيكاً مخففاً واتركه مدة فلا
يتولد راسب ثم اضف الى السيال ماء النشادر محرراً اياه تحريكاً
دائماً حتى تفوح رائحة النشادر فيرسب راسب يدوب عند زيادة
ماء النشادر اغل السائل هذا واضف اليه في حالة الغليان نقطة
بعد نقطة من الهيدر وكبريتيد الامونيك فيتولد راسب اصفر

الكاشف الخاصي للكدميوم

(٢١) اللون الاصفر (انظر بند ٢٠) هو الكاشف الخاصي
ولتحقيق وجود الكدميوم رشح السيال وضع الراسب بعد غسله في
صحن صيني واغله في حامض كبريتيك مخفف (جزء حامض
كبريتيك وخمسة اجزاء ماء) فيتحول الكبريتيد الكدميك الى
الكبريتات الكدميك ويدوب. خذ السيال هذا وخففه واضف
اليه هيدر وجيناً مكبرتاً فيتولد راسب اصفر هو الكبريتيد الكدميك

ملاحظات خصوصية

(٢٢) ما تقدم برى ان الزبيق والرصاص والبنموث والنحاس والكلميوم ترسب من مذوباتها بهيدروجين مكبرت على هيئة كبريتيدات لا تذوب في الماء ولا في السائلات المحمضة ولا في القلويات وقد جعلنا الرصاص والزبيق بين مواد الصف الاول والثاني وذلك لان الرصاص الذي رسب بحامض هيدروكلوريك على هيئة كلوريد (وجعل اذ ذاك من الصف الاول) يذوب قليلاً في السيلال ولذا لا يفرز عنه بالترشيح كلياً مع مواد الصف الاول والذي ذاب يرُسب بهيدروجين مكبرت على هيئة كبريتيد الذي لا يذوب في الماء ولا في السائلات المحمضة ولا في القلويات فلذلك جعل من الصف الثاني

اما الزبيق فيوجد على هيئة ملح زبيقوس وملح زبيقك فان كان الزبيق تحت الفحص على هيئة ملح زبيقوس يتولد بالفاعل العمومي للصف الاول الكلوريد الزبيقوس الذي لا يذوب في الماء فجعل اذ ذاك من الصف الاول وان كان على هيئة ملح زبيقك يذوب في الماء فلا يجعل مع مواد الصف الاول بل يبقى في السيلال بعد تفريق مواد هذا الصف ويرسب بهيدروجين

مكبرت على هيئة الكبريتيد الزيتيك الذي لا يذوب في الماء
ولا السائلات المحمضة ولا القلويات فجعل اذ ذاك من الصف
الثاني

(٢٢) قد تقدم ان مواد الصف الاول ترسب بواسطة حامض
هيدروكلوريك ولا بد من تفريقها قبل استعمال الفاعل
العمومي للصف الثاني فالان ننبه المحلل انه لا بد له من
استعمال الحامض الهيدروكلوريك قبل استعمال
الهيدروجين المكبرت حتى ومع عدم وجود
عنصر من عناصر الصف الاول وذلك
ليجعل السيل محمضاً فيمنع
رسوب عناصر الصف
الرابع والصف
الخامس

جدول ا

(٢٤) نظهر الطريقة الساء

ان الفاعل العمومي للصف الثاني وهو هـ ن هـ ك يولد كبريتيدات كل
الصف الثالث التي تستفرد بالهيدرات الصوة

فلا يدوب الكبريتيد	فيتحول الرصاص والبزموث والكدميوم
الزيبتيك ويتحقق وجود	حامض كبريتيك مخفف للسيال
الزيبتيك بواسطة شريط نحاس	
(بند ٢٢)	

يرسب رص ك اء ويتحقق	ويتولد الكبر
وجود الرصاص بتحويل	في السيال و
الكبريتات الرصاصيك الى	
الكرومات الرصاصيك	يتولد الهيدرو
(بند ٢٥)	الذي لا يند
	النشادر
	البزموث
	(بند ٢٧)

صف الثاني

ايضا حها من هذا الجدول

من الزبيق والرصاص والبزموث والكدميوم والنحاس (فضلاً عن عناصر ك). اغل هذه الرواسب بالحامض النيتريك

النحاس من هيئة الكبريتيدات الى هيئة فينراتات وتذوب وبعد اضافة

ات البزموثيك والكبريتات الكدميك والكبريتات النحاسيك التي تذوب
اضافة ماء النشادر اليها بزيادة

البزموثيك ويتولد الهيدرات الكدميك والهيدرات النحاسيك اللذان
بزيادة ماء يدوبان في السيل ارسبها على هيئة كبريتيدها بواسطة
يتحقق وجود هـ ن هـ ك واغلبها بحامض كبريتيك مخفف

فيتولد ك د ك ا٤ ويتحقق	فلا يدوب النحاس ويتحقق
وجود ك بروسويه بواسطة	وجوده بواسطة الفروسيانيد
هـ ك (بند ٣١)	اليوتاسيك (بند ٣٩)

في ماهية الراسب

(٣٥) اذا رسب راسب من سيال ما محمض وهو لا يذوب في الهيدرات الصوديك يتحقق وجود كل من الزبيق والرصاص والبزموث والنحاس والكيميوم في السيال او بعضها ثم اذا لم يذب هذا الراسب في حامض نيتريك مخفف فالذي في السيال من الصف الثاني زبيق فقط واذا ذاب فيه بعد ازالة كل الحامض الهيدروكلوريك بالغسل كما ذكر يدل ذلك على عدم وجود زبيق في السيال وعلى وجود كل من الرصاص والبزموث والنحاس والكيميوم او بعضها واذا ذاب البعض وبقي البعض الاخر غير ذائب يدل ذلك على وجود زبيق ومادة اخرى ثم اذا تولد راسب ابيض بعد مدة من اضافة الحامض الكبريتيك المخفف الى المذوب في الحامض النيتريك المذكور انفا يدل ذلك على وجود الرصاص واذا لم يتولد هذا الراسب بعد هذه المدة نعلم عدم وجود الرصاص في السيال

خذ السيال الباقي بعد تفريق الرصاص ان وجد او السيال الذي لم يتولد فيه راسب عند اضافة الحامض الكبريتيك المخفف واضف اليه نقطاً قليلة من ماء النشادر فان تولد راسب دل ذلك على وجود كل من البزموث والنحاس والكيميوم او بعضها واذا لم

يتولد فعلي عدم وجودها ثم اذا لم يذوب هذا الراسب بزيادة ماء
النشادر يدل على وجود بزموث فقط غير ان الرصاص يولد مع
ماء النشادر راسباً ايض لا يذوب بالزيادة فيجب الفحص
الخصوصي عن البزموث واذا ذاب بزيادة ماء النشادر ولم يزرَق
السيال فالمادة كدميوم فان ذاب وازرق السيال فالمادة اما نحاس
وحده او نحاس وكدميوم معاً

كيفية تفريق مواد الصف الثاني

(٢٦) يتوقف تفريق مواد الصف الثاني عن بعضها على اربعة

قضايا وهي

اولاً ان الكبريتيد الزينتيك لا يذوب في حامض نيتريك
مخفف غالباً اما الكبريتيدات الأخرى من هذا الصف فتتحول الى
نتراتات عند غليانها في حامض نيتريك مخفف وتذوب فيه
ثانياً ان الحامض الكبريتيك المخفف يحوّل النترات
الرصاصيك الى كبريتاتيه الذي لا يذوب في السيال المحمض اما
كبريتات كل من البزموث والنحاس والكدميوم فتذوب فيه
ثالثاً ان ماء النشادر يرسب بزموثاً وكدميوماً ونحاساً على
هيئة هيدراتاتها اما الهيدرات البزموثيك فلا يذوب عند زيادة

ماء النشادر واما هيدرات كل من الكدميوم والنحاس فيذوبان
عند زيادته

رابعاً ان الحامض الكبريتيك المخفف الغالي يحول الكبريتيد
الكدميك الى كبريتاته الذي يذوب فيه اما الكبريتيد النحاسيك
فلا يؤثر فيه الحامض الكبريتيك المخفف الغالي

في ما يُستفاد من ظواهر الراسب

(٣٧) يجب عند استعمال الهيدروجين المكبرت ان تلاحظ
النتائج اذ يمكنك بها ان تستعين على معرفة المادة التي تحت
المنحص اذا كانت واحدة فقط مثال ذلك

اولاً اذا تولد راسب ابيض يتحول الى اصفر ثم الى برتقالي ثم الى
احمر مسمر واخيراً يسود عند ما يشبع السيل غازاً فيستدل من
ذلك على وجود ملح زيبتيك

ثانياً اذا راسب راسب احمر مكث يتغير الى اسود فيستدل من
ذلك على وجود الرصاص

ثالثاً اذا راسب راسب اصفر يستدل به على وجود كدميوم
او زرنج او قصدير من الصف الثالث. والكبريتيد الكدميك
يمتاز عن هذين الآخرين بانه لا يذوب في الهيدرات الصوديك

وإذا تولد راسب اسود بسرعة يدل ذلك على وجود نحاس أو
 بزموث وهذا مما يمنعنا عن أن ننظر إلى الرواسب المتقدم ذكرها
 رابعاً إذا كان في السيال تحت الفحص كرومات ما (يُعرف
 بلونه الأصفر أو الأصفر المحمر) يتحول لونه إلى لون أخضر
 خامساً إن لم يوجد عنصر من عناصر الصف الثاني فقد
 يتولد راسب بيض أو بيض مصفرة من رسوب الكبريت وذلك
 لأن الهيدروجين المكبرت ينحل بسهولة مع رسوب الكبريت بواسطة
 حامض نيتريك أو حامض كروميك أو حامض كلوريك أو كلور أو
 أملاح الحديد وإن كان في السيال تحت الفحص حامض نيتريك
 بزيادة فلا بد من إطالة مجرى الهيدروجين المكبرت لترع الحامض
 وتشيع السيال فقد يرسب الكبريت والحالة هذه على هيئة راسب
 أصفر مكد على أن الكبريت يرسب غالباً على هيئة ذرات صغيرة
 بهذا المقدار حتى لا تستفرد بالمرشحة الأبصوبة كلية وعلى الخصوص
 إذا وجد في السيال ملح من أملاح الحديد ويجب على المحلل تفريق
 الكبريت بالمرشحة قبل استعمال كاشف آخر من الكواشف الآتية
 سادساً إن لم يرسب راسب بالهيدروجين المكبرت نعلم أنه
 لا يوجد في السيال تحت الفحص مادة من مواد الصف الثاني
 (ولامن الصف الثالث كما سيذكر)


الفصل الثالث

في الصف الثالث

وهو مركب من مواد معدنية لا تذوب كبريتيداتها في الماء ولا في
السوائل الحمضة بل تذوب في القلويات وتمتاز اذذاك عن
مواد الصف الثاني التي لا تذوب في القلويات كما قد ذكر

الفاعل العمومي هو هيدروجين مكبرت

سبعة ٥٢٦



كيفية رسوب الزرنيخ

(٢٨) ضع في انبوبة مذوب الحامض الزرنيخوس او زرنيخت ما واضف الى السيال خمس نقط او ستاً من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب ثم اضف اليه هيدروجينا مكبرنا كافياً لتشييعه تشيعاً تاماً فيتولد راسب اصفر لامع هو الكبريتيد الزرنيخوس (زرنيخ ك). اغل السيال وانت تمزقه من مدة الى مدة كي يتجمع الراسب ثم رشه واغسله جيداً واغل هذا الراسب في ما يغمره من الهيدرات الصوديك فيذوب بسهولة. حمض السيال هذا بحامض نيتريك قوي فيرسب الكبريتيد الزرنيخوس. رشه واغسل الراسب جيداً مع الانتباه التام لازالة كل الحامض النيتريك وكيفية ذلك ان يصب عليه من الماء وهو في المرشحة الى ان لا يعود يؤثر الماء النازل عنه في ورق اللتوس. ثم جفف الراسب تدريجاً بجمارة خفيفة واغله في حامض هيدروكلوريك ثقيل فلا يذوب. رشه واغسل الراسب. اغله في حامض نيتريك فيتحول الزرنيخ الى زرنيخا، ويزوب. جفف السيال هذا وخففه بما هو واقسمه الى قسمين

الكاشف الخاص للزرنيخ

(٢٩) خذ قسماً من القسمين المتقدم ذكرهما واضف اليه من

مذوب النترات الفضيكة مقداراً ليس بقليل ثم اصف اليه مذوب
الخلات الصوديكة نقطة فنقطة حتى تفوح رائحة الحامض الخليك
فيتولد راسب احمر او اسمر محمر هو الزرنجات الفضيكة

$$٦(فض ن ا٢) + ٢(٥ زرا٤) = ٢(فض زرا٤) + ٦(٥ ن ا٢)$$

قد استخمدنا الخلات الصوديكة لان الزرنجات الفضيكة
يدوب في حامض نيتريك ولا يدوب في حامض خليك ان لم
يكن زائداً كثيراً والخلات الصوديكة عند اضافته الى سيال فيه
حامض نيتريك يتحول الى نترات الصوديكة مع انفراد الحامض
الخليكة. قد يتولد زرنجات الفضة حالاً عند اضافة النترات
الفضيكة وذلك لسبب كثرة الزرنج في السيال ولا يلزمنا اذ ذاك
ان نستعمل الخلات الصوديكة. وقد يتولد راسب ايض عند
اضافة النترات الفضيكة من وجود كلور في السيال حاصل عن
استعمال الحامض الهيدروكلوريك او عن كاشف يدخله كلور
ويفرق هذا الراسب بالمرشحة بعد اضافة قليل من حامض نيتريك
لتذويب الزرنج الموجود فيه ثم يضاف الخلات الصوديكة للمرشح
كما تقدم

ثانياً خذ القسم الثاني من القسمين المار ذكرهما واصل اليه
نقطاً قليلة من مذوب الكبريتات المنغنيسيك والكلوريد

الامونيك في ماء قليل مخالطة قليل من ماء النشادر وانزعة مدة كافية فيتولد راسب ابيض بلوري (واذا كان الزرنج قليلاً يلزم ترك هذا السيلال مدة ١٢ ساعة لتولد هذا الراسب) ولزيادة التدقيق في كشف الزرنج اذا اقتضى الحال وخصوصاً اذا كان الزرنج في السيلال قليلاً جداً يستعمل الكاشف المعروف بكاشف مارش الذي سيذكر

كيفية التمييز بين الحامض الزرينخوس والحامض الزرينخيك

(٤٠) ان الزرنج يوجد على هيئة حامض زرينخوس او حامض زرينخيك او على هيئة الاملاح الزرينخيت او الزرينجات فيجب اذ ذاك بعد وجود الزرنج في المادة تحت الفحص ان يميز بين كونه على هيئة الزرينخيت او الزرينجات

اضف الى مذوب المادة تحت الفحص الهيدرات البوتاسيك بزيادة ثم نقطاً قليلة من مذوب الكبريتات النحاسيك المخفف واغله فان كان الزرنج على هيئة زرينخيت يتولد راسب احمر هو الاكسيد النحاسوس (نخ_٢) ويبقى الزرنج ذائباً في السيلال على هيئة زرينجات البوتاسيك

زرر_٢ + ٢(نخ ك ا_٤) + ٢(پ ٥ ا_٥) + ٢(١_٢ ٥) = نخ_٢ + ١_٢
 ٢(پ ٥ زرا_٤) + ٢(١_٢ ك ا_٤)
 وان كان على هيئة زرنجات فلا شيء من ذلك

كيفية رسوب الاتيمون

(٤١) خذ مذوب الاتيمون في حامض هيدروكلوريك مخفف وخففه بما عرفت عكر السبال اضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً ثقيلاً نقطة بعد نقطة وانت تهز الانبوبة حتى يروق ثم اضف الى السبال (هيدروجيناً مكبرتاً) ما يكفي لتشييعه فيتولد راسب برتقالي اللون سميته انت_٢ ك_٢ وهو الكبريتيد الاتيمونوس . اغله قليلاً ورشحه واغسل الراسب جيداً واغله في ما يغمره من الهيدرات الصوديك فيذوب . حمض السبال هذا بحامض نيتريك فيعود يرسب الكبريتيد الاتيمونوس . رشحه واغسله جيداً لازالة كل الحامض النيتريك وجففه بجمارة خفيفة واغل الراسب في حامض هيدروكلوريك ثقيل فيذوب . خفف المذوب بقليل من الماء وضعه في بوظقة من پلاتين او في صحن صيني مع قطعة پلاتين نظيفة ثم ضع في السبال هذا قطعة من الزنك النقي فعند تولد غاز الهيدروجين ينفرد الاتيمون المعدني ويجمع على الپلاتين فيسوده

ارفع الزنك والسيال بعد نهاية تولد الغاز واغسل البلاطين في حامض هيدروكلوريك ثقيل فلا يذوب الا نيمون

الكاشف الخاص للانيمون

(٤٢) ضع البلاطين في ماء الذهب فينظف البلاطين اذ يذوب الانيمون عنه ثم اضع الى السيال هذا هيدروجينا مكبرتا فيرسب راسب برتقالي اللون كما حدث في اول الفحص


كيفية رسوب القصدير

(٤٣) خذ مذوب القصدير واضف اليه خمس نقط او ستا من الحامض الهيدروكلوريك ولا يرسب شي ثم اضع الى السيال حامضاً هيدروكبريتيكاً فان كان القصدير على هيئة ملح قصدير روس يتولد راسب اسمر مكد (الكبريتيد القصدير روس) وان كان على هيئة ملح قصدير يرك يتولد راسب ابيض يتحول بعد حين الى اصفر مكد (الكبريتيد القصدير يرك) اغله قليلاً ليتجمع الراسب ورشحه واغسله. اغله ايضاً في ما يغمره من الهيدرات الصوديك فيذوب. حمض السيال بحامض نيتريك فيعود القصدير يرسب. رشحه واغسله لازالة كل الحامض النيتريك. ثم جففه بجمارة

واطئة واغليه في حامض هيدروكلوريك ثقيل فيذوب. خفف
السيال هذا بقليل من الماء وضعه في بوظقة پلاتين او في صحن
صيني مع قطعة من الپلاتين. ثم ضع في السيال قطعة من الزنك
النقي فينفرد الفصدبر المعدني عند تولد الغاز وعند نهاية تولد
الغاز اسكب السيال مع الانتباه الكلي الى ان لا يخرج معه شيء من
المواد المعدنية فيه. غسل التوتيا بالماء لاجل تنظيفها مما التصق بها
واغل الپلاتين (مع المادة الباقية بعد تنظيف التوتيا) في حامض
هيدروكلوريك ثقيل فيذوب الفصدبر

الكاشف الخاص للقصدير

(٤٤) خفف المذوب في حامض هيدروكلوريك بماء
واضف اليه مذوب الكلوريد الزيبك فيتولد راسب ايض
هو الكلوريد الزيبكوس من اتحاد جزء من الكلور في الكلوريد
الزيبك مع الفصدبر




كيفية تفريق راسب الصف الثالث

(٤٥) يتوقف تفريق مواد هذا الصف على ثلاث قضايا

اولاً ان الكبريتيد الزرنيخوس لا يذوب في حامض نيتريك
واما الكبريتيدات الالتيمونوس والقصدريك والقصدبروس
فتذوب فيه

ثانياً ان الالتيمون والقصدبر ينفردان على هيئة معدن بالحامض
الهيدروكلوريك المخفف والزنك

ثالثاً ان القصدبر المعدني يذوب في الحامض الهيدروكلوريك
الغالي واما الالتيمون فلا يذوب فيه



جدول ا

(٤٦) فنظر الطريقة ا

ان الفاعل العمومي للصف الثالث حامض هيدروكبريتيك (هـ) ك
والكبريتيد الفصد بروس (ق ك) او الكبريتيد الفصد بريك (ق ك)
كبريتيداتها ايضاً كما ذكرنا وبعد تذويب هذه الرواسب في الهيدرات
الهيدرات الصوديك) ورسوبها ثانية بالحامض النيتريك المخفف و

فلا يذوب الكبريتيد الزرنيخوس ويتحقق وجود	فلا يذوب الكبريتيد
الزرنيخ بنذوب كبريتيد هذا في حامض نيتريك	في سخن مع قطعة يا
ثقيل وبالكشف عنه بكاشفه الخصوصي النترات	وغسل الزنك يغلى ا
الفضيك او بالكبرينات المغنيسيك كما ذكر في	

بند ٣٩

فلا يذوب الانتيمور
في ماء الذهب

بند ٤٢

ف الثالث

لم يانها من هذا الجدول

إلد الكبريتيد الزرنيخوس (زرر ك م) والكبريتيد الاتيموثوس (انت ك م)
 لكبريتيد الذهبك والكبريتيد الپلاتينك (وعناصر الصف الثاني على هيئة
 سوديك) لتفريقها عن مواد الصف الثاني التي لا تذوب كبريتيدتها في
 وتخفيفها تُغلى في حامض هيدروكلوريك ثقيل

الاتيمونوس والتصدير يك والتصدير وس وبعد تخفيف المذوب بماء يوضع
 نظيفة وقطعة زنك نقيه فينفرد الاتيمون والتصدير ثم بعد صب السيل
 تين وما قد جُبع على الزنك في حامض هيدروكلوريك ثقيل

تفق وجوده بعد تدوييه | فيذوب التصدير ويتحقق وجوده بعد تخفيف
 جين مكبرث انظر السيل بماء بالكلوريد الزبيقك كما ذكر في
 بند ٤٤

ماهية رواسب الصف الثالث

(٤٧) اذا لم يوجد عنصر من عناصر الصف الثاني يستدل بلون الراسب اي عنصر وُجد من الصف الثالث عند استخدام الهيدروجين المكثرت

اولاً الراسب الاصفر يدل على وجود الزرنيخ وقد رأينا ان الكدميوم من الصف الثاني يرسب بالحامض الهيدروكبريتيك كراسب اصفر لذلك اذا رسب راسب اصفر لاعم عند استخدام الحامض الهيدروكبريتيك يدل به على وجود كدميوم و زرنيخ كليهما او احدهما وعلى عدم وجود عنصر اخر من عناصر الصف الثاني والثالث واذا ذاب هذا الراسب الاصفر في الهيدرات الصوديك فهو زرنيخ والأ فهو كدميوم واذا ذاب البعض وبقي البعض الاخر غير ذائب فهو كدميوم و زرنيخ

ثانياً الراسب البرتقالي يدل على وجود انثيمون فقط وعلى عدم وجود عنصر من عناصر الصف الثاني والثالث وهذا الراسب البرتقالي يذوب في الهيدرات الصوديك

ثالثاً اذا تولد راسب ابيض يتحول الى اصفر مكمد يدل به على وجود ملح قصدير يك

رابعاً الراسب الاسمر المعتم يدل على وجود ملح قصديروس
خامساً يرسب الذهب والپلاتين على هيئة راسب اسود يمتاز
عن الرواسب السوداء من الصف الثاني بتدويبه في الهيدرات
الصوديك وبما ان الكواشف الخصوصية عن الذهب والپلاتين
هي واضحة ومدققة مها خالطها من المواد فالوفق اذا ان يكشف
عنها رأساً في المادة تحت الفحص اذا وجد داع للظن بوجودها

الكاشف الخاص للذهب

(٤٨) ذوب المادة المظنون بانها ذهب او فيها ذهب في جزء
واحد من الحامض النيريك وثلاثة او اربعة اجزاء من الحامض
الهيدروكلوريك ثم جفف السائل هذا الى ان لا يبقى منه الا القليل
وضعه في وعاء من زجاج موضوع على قطعة قرطاس ايض بحيث
يظهر الراسب جيداً ثم اغمر قضيب زجاج في مذوب الكلوريد
القصديروس (ق كل ٢) المصفر بنقط قليلة من الكلوريد
الحديديك (ح كل ٦) وغطسه في المذوب تحت الفحص فاذا
وجد فيه ذهب يتلون السائل حول هذا القضيب بلون ازرق او
قرنفي حتى ولو مها كان الذهب قليلاً

الكاشف الخاص للبلاتين

(٤٩) ذوب المادة المظنون فيها بلاتين في ماء الذهب (جزء
من الحمض النيتريك واربعة اجزاء من الحمض الهيدروكلوريك)
واضف الى المذوب وهو بارد الكلوريد الامونيك فيتولد راسب
اصفر بلوري هو الكلوروبلاتينات الامونيك
يدقق الكاشف باضافة الكحول الى السيل واذ كان مقدار
البلاتين قليلاً جفف مذوبه بعد اضافة الكلوريد الامونيك ثم ذوبه
في مزيج من الماء والكحول فيذوب كل ما فيه الا الكلوروبلاتينات
الامونيك وهو راسب اصفر بلوري كما ذكر

الاحنياطات اللازمة في الفحص عن مواد الصف

الثاني والصف الثالث

(٥٠) اذا كان المذوب محمضاً كثيراً فيجب تخفيفه بالماء قبل
اضافة الحمض الهيدروكلوريك لان مواد هذين الصنفين لا ترسب
بالسهولة من مذوبات حمضة والكدميوم لا يرسب الا قليلاً من
سيل حمض
ولكن ان لم يكن المذوب محمضاً كافياً فترسب مواد غير مواد

هذين الصفيين عند اضافة الحامض الهيدروكبريتيك فانتبه
 وقد يتعكر المذوب عند تخفيفه (من وجود البزموت او
 الالتيومون او كليهما) فيعود يذوب هذا الراسب عند اضافة نقط
 قليلة من الحامض الهيدروكلوريك

والزرنيخ لا يرسب الا بالصعوبة بواسطة الحامض
 الهيدروكبريتيك فيجب اذذاك تشبيح السائل حامضاً هيدروكبريتيكاً
 واذا كان مقدار الزرنيخ قليلاً والحامض الهيدروكبريتيك يستعمل
 غازاً فيجب انفاذ الغاز في السائل مدة ساعات بالاقبل واذا
 تولد راسب ايض فقط عند استخدام الحامض الهيدروكبريتيك
 فيدل به على عدم وجود مواد الصف الثاني والصف

الثالث لان هذا الراسب هو كبريت

متولد من انحلال الحامض

الهيدروكبريتيك

الفصل الرابع


في الصف الرابع

وهو مركب من مواد معدنية لا تذوب هيدراتاتها في الماء ولا في ماء النشادر حتى ولو وجد ملح من املاح الامونيوم

الفاعل العمومي. ماء النشادر

سببته (٥٥ من ١٥٠)

(ويستخدم الكلوريد الامونيك لمنع رسوب مواد المصف الخامس)



كيفية رسوب الكروم

(٥١) خذ مذوب اي ملح كان فيه كروم كالكرومات الپوتاسيك مثلاً او الثاني كرومات الپوتاسيك فيدل لونه الاصفر او الاحمر على وجود الكروم واطف اليه خمس نقط او ستاً من الحامض الهيدروكلوريك فلا يرسب راسب ثم اطف اليه هيدروجيناً مكبرتاً واغله فيخضّر السبال ويدل بذلك على وجود الكروم (كروم ٢) ثم اغل المزيج لطرء كل الهيدروجين المكبرت حيثما يُعرف ذلك باعراض الورق المبلول بمذوب النترات الرصاصيك على البخار الصاعد من السبال فان لم يسود يدل على عدم وجود الهيدروجين المكبرت فيه والا فلا. ثم اطف الى السبال وهو غالي ثلاث نقط من الحامض النيريك (لسبب سيذكر في الكشف عن الحديد بند ٥٦). ثم اطف الى السبال مذوب الكلوريد الامونيك وبعد ذلك ماء النشادر والسبال غالي ايضاً فيرسب راسب اخضر رمادي او رمادي مزرق هو الهيدرات الكروميك (كروم ٢) جفف الراسب بعد ترشيبه وغسله وامزجه مع خمس اوست اضعافه من مزيج مجفف يحنوي على مقدارين متساويين من الكربونات الصوديك والنترات الپوتاسيك واحمه جيداً على

قطعة بلاتين حتى يصهر كلياً فيتولد الكرومات الصوديك
(ص_٢ كروا_٤) لونه اصفر لامع. ضع البلاطين وما عليه في صحن
صيني واغله في ما يغيره من الماء فيذيب ويلوّن السبال لوناً اصفر

الكاشف الخاص للكروم

(٥٢) خذ مذوب الكرومات الصوديك المذكور وحمضه
بجامص خليك ثم اضع الى السبال نقطتين او ثلاث نقط من
مذوب الخلات الرصاصيك رص (٢ كرو_٢ ٥٢٠٠٠) فيتولد راسب
اصفر لامع هو الكرومات الرصاصيك (رص كروا_٤) (على ان
الراسب هذا يميل لونه الى الياض اذا كان الكربونات الصوديك
مخلوطاً بالكبريتات الصوديك وهذا من تولد الكبريتات
الرصاصيك) اكتب كيفية التحليل والتركيب

كيفية رسوب الالومينوم

(٥٣) خذ مذوب الشب الابيض واضف اليه خمس نقط
اوستا من الحامض الهيدر وكلوريك فلا يتولد راسب اضف اليه
حامضاً هيدروكبريتيكاً فلا يتولد راسب. ثم بعد طرد الهيدروجين
المكثرت واضافة حامض نيتريك وكلوريد الامونيوم الى السبال

على الكيفية التي ذُكرت في بند ٥١ اُضف اليه وهو يغلي ماء
النشادر فيتولد راسب جلاتيني لالون له هو الهيدرات الالومينيك
(ال ١٥٢٠١) جفف الراسب هذا بعد ترشيحه وغسله وامزجه مع
مزيج الكربونات الصوديك والنترات الپوتاسيك على الكيفية
المذكورة آنفاً واحمه على قطعة پلاتين حتى يصهر فيتولد الالومينات
الصوديك. ضع الپلاتين وما عليه في صحن صيني واغله في ما يغيره
من الماء فيذوب

الكاشف الخاص للالومينوم

(٥٤) خذ مذوب الالومينات الصوديك وحمضه بجامض
هيدروكلوريك مخفف ثم اجعله قليلاً قليلاً بماء النشادر واتركه
مدة بضع ساعات اذا اقتضى الامر فيتولد راسب خصوصي جلاتيني
لالون له هو الهيدرات الالومينيك وهذا الراسب متفرق احياناً
بالسيال ويرى بصعوبة وايضاً لا يتحول الالومينوم بسهولة عند
اصهاره مع الكربونات الصوديك الى الالومينات الصوديك
القابل الذوبان في الماء واذ ذاك قد يكون راسب الهيدرات
الالومينيك قليلاً فلا بد من تركه بضع ساعات اذا اقتضى الحال
الى ان يجتمع الراسب ويظهر

كشف مدقق للالومينوم

(٥٥) ولينتحق وجود الالومينوم اجمع هيدراته المذكور انفاً في قاع المرشحة ثم افصل الورق المجموع عليه الالومينوم وضعه على قطعة فحم واحمه جيداً بلهب البوري ثم رطبه بنقطة من مذوب النترات الكوبلتيك واحمه ثانية بلهب البوري فتبقى المادة غير القابلة الاصهار على الفحم وعند ما تبرد نتخذ لونا ازرق غامقا ومن ذلك تميز الهيدرات الالومينيك عن الهيدرات الكلوسينيك الرمادي اللون والناذر الوجود

كيفية رسوب الحديد

(٥٦) خذ مذوبا من املاح الحديد واُضف اليه خمس نقط او ستاً من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب ثم اُضف الي السيال هيدروجينا مكبرتا فلا يتولد راسب ايضاً غير ان الحديد اذا كان على هيئة ملح حديديك يتحول الى ملح حديدوس مع رسوب الكبريت الناتج عن انحلال الحامض الهيدروكبريتيك . رشح السيال لتفريق الكبريت ان وُجد واغله لطرده الهيدروجين المكبرت واُضف اليه وهو غالٍ ثلاث نقط او اربع من الحامض

التيتريك لتحويل الحديد إلى ملح حديدك ثم اضعف الى السيال مذوب الكلوريد الامونيك وماء النشادر فير سب الحديد على هيئة راسب احمر مسمر هو الهيدرات الحديدك (ح ٢٥٢-٢٥١)
 جفف الراسب بعد غسله وامزجه جيداً مع خمس اوست اضعافه من مزيج الكربونات الصوديك والنيترات البوتاسيك واحمه على قطعة پلاتين الى ان يصهر فيجهر المزيج من الاكسيد الحديدك ضع الپلاتين وما عليه في صحن صيني واغله في ما يغمره من الماء فلا يذوب الاكسيد الحديدك

الكاشف الخاص للحديد

(٥٧) اغل الراسب المذكور في قليل من حامض هيدروكلوريك ثقيل فيذوب خفف السيال هذا بالماء واضف اليه نقطة او نقطتين من الفروسيانيد البوتاسيك فيزرق

كيفية رسوب المنغنيس

(٥٨) خذ مذوب ملح من املاح المنغنيسك واضف اليه خمس نقط او ستاً من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب اضف اليه حامضاً هيدروكبريتيكاً ولا يتولد راسب ايضاً اغل

السيال لطرد الحامض الهيدروكبريتيك ثم اضع الى السيال وهو غالٍ ثلاث نقط او اربع من الحامض النيتريك ثم اضع اليه ماء النشادر ويرسب راسب هو الهيدرات المنغنيس غير انه لا يرسب اذا وُجد في السيال الكلوريد الامونيك (وقد ذكرنا المنغنيس الان بين مواد هذا الصف الرابع لانه احياناً يرسب معها وان رسب مع مواد هذا الصف فلا يضر بالكواشف عن الكروم والالومينوم والحديد المذكورة انفاً والآن نذكر كاشفاً عن المنغنيس يصح حتى ومع وجود هذه المواد) رشح السيال اذا تولد راسب وجفف الراسب بعد غسله وامزجه مع خمس اوست اضعافه من مزيج الكربونات الصوديك والنترات البوتاسيك واحمه على قطعة پلاتين حتى يصهر فيتولد لون ازرق مخضر هو المنغنات الصوديك ويتولد ايضاً الاكسيد المنغنيس. ضع الپلاتين وما عليه في صحن صيني واغله في ما يغمره من الماء فالمنغنات الصوديك يذوب والاكسيد المنغنيس لا يذوب بل يبقى على هيئة راسب

الكاشف الخاص بالمنغنيس

(٥٩) خذ الراسب المذكور واحمه على قطعة پلاتين مع ضعفيه من الكربونات الصوديك والنترات البوتاسيك بلهيب

البوري المؤكسد فيينا يبرد يحصل لون اخضر مزرقٌ يختص
 بالمنغنات الصوديك وفي اثناء ذلك انك القطعة من الپلاتين
 على جوانبها الاربعة بالتتابع حتى يفرش السيل المصهور على كل
 السطح ويكسوه فيظهر اللون جيداً

ملاحظات خصوصية

(٦٠) يوجد مركبات التي ترسب مع مواد هذا الصف مثل
 فصنات بعض المواد من الصف السادس والصف السابع
 وبعض الاكسولات والبوراتات والسليكات والفلوريدات
 النادرة الوجود والمنغنيس احياناً كما قد ذكر فلابستغنى اذ ذاك
 عن كواشف تصدف على عناصر الصف الرابع سواء وجدت
 عناصر اخرى ام لم توجد وقد ذكرنا في البند السابقة
 من ٥٠ الى ٥٨ كواشف تصح حتى وعند وجود
 اي مادة كانت من هذه المواد
 المذكورة في هذا
 البند

جدول

(٦١) فتظهر الطريقة ا

ان الفاعل العمومي للصف الرابع هون ه٥٥٥٥ (ويستخدم ه٥٥٥٥ من كل
هيئة هيدراتاتها) وقد يرسب المنغنيس وبعض مركبات الكلسيوم و
مع (ص ٢ كرا٢) و(پ ن ٢) ثم ذوبه في الماء الغالي ورشحه

اقسم الراسب الى اربعة اقسام

اكشف عن المنغنيس	اكشف عن الحديد	اكشف عن الكلسيوم
باصهار القسم الاول مع	في القسم الثاني	والمواد الأخر في الق
ص ٢ كرا٢ وپ ن ٢	بواسطة الفروسيانيد	الثالث برسوبها بواس
بند ٥٩	الپوتاسيك بند ٥٧	حامض خليك
		والاكسالات الامونيا
		كاسيدكر

صف الرابع

من ايضاحها من هذا الجدول

بما يمنع رسوب مواد الصف الرابع) يرسب الحديد والكروم والالومينوم على
بيوم والباريوم والسترونتيوم مع مواد هذا الصف (جفف الراسب واصهره

اقسم المرشح الى قسمين		
حمض القسم الثاني	ان لون المرشح الاصفر	فرق المغنيسيوم في
من المرشح بواسطة	يدل على الكروم ويتحقق	القسم الرابع بتذويبه
ه كل واضف اليه	ذلك برسويه من	في ه كل وسيدكر
(ن ه ٤) ه ا فندل التقطع	القسم الاول بواسطة	الكاشف
اللزجة الصغيرة على	الخلات الرصاصيك	
الالومينوم بند ٥٤ ويتحقق	على هيئة الكرومات	
وجوده بالبورى بند ٥٥	الرصاصيك بند ٥٢	

في ما يستفاد من ظواهر رواسب الصف الرابع
 (٦٢) اننا من ظواهر الراسب الناتج بعد استعمال ماء النشادر
 نقدر ان نحصل على ما يعيننا في تعيين العناصر الموجودة جزماً
 أولاً الراسب الابيض اللزج يدل على وجود الومينوم او
 عناصر اخرى من صف آخر

ثانياً الراسب الاخضر الرمادي او الازرق الرمادي يدل
 على وجود الكروم او بعض المركبات المذكورة في بند ٦٠
 ثالثاً الراسب الاسمر المحمر يدل على وجود الحديد
 فان لم يرسب راسب دل على عدم وجود عنصر من عناصر
 الصف الرابع

اذا وجد في المذوّب كروم بكثرة يتلون المذوّب بلون قرنفلي
 غير انه يجول بعد الغليان ويرسب الكروم بلونه واذا اغلي
 المذوّب حتى يرسب الكروم يجب اضافة قليل من الماء ليقيم
 مقام الماء الذي تصعد على هيئة بخار ولاّ فتصير عناصر الصف
 الخامس غير قابلة الذوبان فان وجد في المادة تحت الفحص مادة
 آية فلا يمكن رسوب عناصر الصف الرابع بماء النشادر
 فلا بد لذلك من نزع المادة الالية كما
 سيذكر


الفصل الخامس

في الصف الخامس

وهو مركب من مواد معدنية لا يذوب كبريتيداتها في الماء ولا في القلويات حتى ولو وُجد في مذوباتها ملح من الاملاح الامونيك

الفاعل العمومي الهيدروكبريتيد الامونيك

سميته (٥٤٥ ن ٥ ك)



كيفية رسوب المنغنيس

(٦٢) خذ مذوّب الكلوريد المنغنيس (من كل ٢) وحمضه قليلاً بحامض هيدروكلوريك فلا يرسب راسب. اضع إليه حامضاً هيدروكبريتيكاً فلا يتولد راسب أيضاً. اغلِ السيلال لطرده الحامض الهيدروكبريتيك واطفئه وهو غالٍ ثلاث اواربع نقط من الحامض النيتريك ثم اضع إليه ثلاث ملاعق صغيرة من الكلوريد الامونيك وقليلاً من ماء النشادر ولا يتولد راسب (لان الكلوريد الامونيك يمنع رسوب المنغنيس) اغلِ السيلال واطفئه وهو غالٍ الهيدروكبريتيد الامونيك فيرسب راسب مصفرٌ يسمر بعرضه على الهواء وهو الكبريتيد المنغنيس (من ك) اغسل الراسب جيداً واغمره في صحن صيني بحامض هيدروكلوريك مخفف بارد فيذوب فيه. ضع المذوّب في انبوبة واغله حتى لا يعود يفعل بخاره في ورق مبلل بمذوب النترات الرصاصيك ثم اضع إليه الهيدرات الصوديك بزيادة فيرسب الهيدرات المنغنيسيك على هيئة راسب ابيض لزج (تنبيه يجب ان لا يستعمل صحن صيني عند ما يقصد رسوب المنغنيس لعدم ظهور الراسب الابيض او الشفاف فيه)

الكاشف الخاص للمغنيس

(٦٤) ليتحقق وجود المغنيس يستعمل الكاشف المذكور في

بند ٥٩

كيفية رسوب الزنك

(٦٥) خذ مذوّب ملح من الاملاح الزنكيك واضف اليه خمس نقط من الحامض الهيدروكلوريك فلا يتولد راسب. اضف اليه حامضاً هيدروكبريتيكا فلا يتولد راسب ايضاً. اغل السيل لطرده الحامض الهيدروكبريتيك بالاتباه التام لطرده كله واضف اليه وهو غال خمس نقط من الحامض النيريك ثم اضف اليه الكلوريد الامونيك وماء النشادر على الكيفية المذكورة فلا يتولد راسب

اضف الى السيل وهو قلوياً الهيدروكبريتيد الامونيك فيتولد راسب ايض لزوج هو الكبريتيد الزنكيك (زنك) تنبيه. لم يتولد الكبريتيد الزنكيك عند استعمال الحامض الهيدروكبريتيك لان السيل كان محمضاً بالحامض الهيدروكلوريك وانما اذا بقي في السيل حامضاً هيدروكبريتيكا ولو كان قليلاً

فيتولد راسب لما يصير السيال قلوياً باضافة ماء النشادر اليه .
 رشح السيال وضع الراسب بعد غسله في انبوبة واغمرة
 بحامض هيدروكلوريك مخفف بارد فيذوب فيه . اغل السيال
 حتى لا يعود يفعل بخاره في ورق مبلول بذبوب النترات
 الرصاصيك ثم اضف اليه الهيدرات الصوديك بالتدرج فيرسب
 الزنك اولاً ثم يعود يذوب عند زيادة الصودا

الكاشف الخاص للزنك

(٦٦) اجر في مذوب الزنك المذكور في آخر البند السابق
 حامضاً هيدروكلوريكاً فيتولد راسب ايض . خذ هذا الراسب
 وذوبه في حامض هيدروكلوريك مخفف وجففه حتى يكاد ينشف
 ثم ذوبه في قليل من الماء مع قطع النظر عما يحدث من التعكر
 وصبه في قليل من مذوب الكرومات الپوتاسيك الغالي فيرسب
 الكرومات الزنكيك على هيئة راسب اصفر

كيفية رسوب النكل والكوبلت

(٦٧) خذ مذوب من ملح النكل وملح الكوبلت (كبريتاتهما
 او نتراتهما) وحمضه بحامض هيدروكلوريك واضف اليه حامضاً

هيدروكبريتيكا ثم اغلِ السيال لطرد الحامض الهيدروكبريتيك
وصب عليه وهو غالٍ خمس نقط او ستاً من الحامض النيتريك
ثم اضف الى السيال مذوب الكلوريد الامونيك وماء النشادر
فلا يتولد راسب عند استعمال اي كاشف كان من الكواشف
المذكورة. اضف الى السيال الآن وهو غالٍ الهيدروكبريتيد الامونيك
ويتولد راسب اسود (هو الكبريتيد الكوبلتوس كوك والكبريتيد
النكلوس نك ك) ولو كان في السيال نكل وحده او كوبلت
وحده يتولد راسب اسود عند استعمال الكبريتيد الامونيك. رشح
السيال واغسل الراسب وضعه في صحن صيني واغمره بحامض
هيدروكلوريك مخفف بارد فلا يذوب الراسب الا قليلاً رشحه
وغسله واقسمه الى ثلاثة اقسام واحمِ القسم الاول منه مع قطعة
بورق بلهيب البوري المؤكسد ويتلون الزجاج الناتج بلون يختلف
على نسبة اختلاف النكل والكوبلت فان كان الكوبلت كافيًا
يتلون بلون ازرق لامع والأفيلون ازرق مسمر ولو كان النكل
وحده يتلون الزجاج بلون اسمر

الكاشف الخاص للنكل

(٦٨) ليتحقق وجود النكل خذ القسم الثاني من الراسب

المذكور انقأ واغله في ماء الذهب وجففه حتى يكاد ينشف واضف الى ما بقي مذوباً قوياً من السيانيد الپوتاسيك بالتدرج الى ان يصير قلوباً ثم اغله خمس دقائق وانت تزيد ماءً من حين الى حين لتعوض عما يفقد بالتحويل الى بخار فيرسب السيانيد النكليك والسيانيد الكوبلتيك فيذوبان بسهولة بزيادة السيانيد الپوتاسيك فيتحول السيانيد الكوبلتيك الى السيانيد الپوتاسيوكوبلتيك ويبقى السيانيد النكليك غير متغير وبعد تبريد المزيج اضف اليه حامضاً كبيرتيكاً مخففاً حتى يصير حامضاً وضعه في انبوبة كبيرة ثم املاء الانبوبة ماءً وهزها جيداً واتركها اربع وعشرين ساعة فيرسب السيانيد النكليك على هيئة راسب اصفر مخضر فاتح مكثد

الكاشف الخاص للكوبلت

(٦٩) ليتحقق وجود الكوبلت ذوب القسم الثالث من الراسب المذكور بنقط قليلة من ماء الذهب الغالي وجففه حتى يكاد ينشف وصب الباقي بعد التجفيف في ثلاثة اضعافه من مذوب النيريت الپوتاسيك واضف الى المزيج حامضاً حليكاماً يجعله حمضاً وانقله الى انبوبة واتركه مدة اربع وعشرين ساعة فيرسب النيريت الپوتاسيوكوبلتيك على هيئة راسب بلوري اصفر جميل

كيفية تفريق رواسب الصف الخامس

(٧٠) مما تقدم يرى ان تفريق رواسب الصف الخامس

يتوقف على اربع قضايا

اولاً ان الكبريتيد الكوبلتوس والكبريتيد النكلوس لا يذوبان

في حامض هيدروكلوريك مخفف بارد الا قليلاً بخلاف الكبريتيد

المنغنيسيك والكبريتيد الزنكيك اللذان يذوبان فيه بسهولة

ثانياً ان الهيدرات الزنكيك يذوب في زيادة صودا كاوا اما

الهيدرات المنغنيسيك فلا يذوب فيه

ثالثاً ان الكبريتيد الزنكيك لا يذوب في القلويات

رابعاً ان الكوبلت والنكل يلونان البورق

بلون خصوصي



(٧١) جدول يتضمن ابضاح الطريقة السابق ذكرها

ان الفاعل العمومي (هـ ن هـ ك) يرسب (من ك) و (زن ك)
 و (نك ك) و (كوك) اغسل الرواسب مرتين بالماء وصب عليها
 جامضاً هيدر وكلوريكاً مخففاً بارداً

فيبقى (كوك) و يذوب (من كل ٢) و (زن كل) اغلها
 و (نك ك) غير ذائبين لازالة (هـ ٢ ك) و اضف (ص ١٥)

اكشف عنها بلهب البورج. وكذلك بواسطة (پ كرن)
 بند ٦٨ و (پ ن ١) بند ٦٩

فيرسب الهيدرات فيرسب الهيدرات
 المنغنيسيك مع قليل الزنك و يذوب
 من النكل والكوبلت بزيادة الصودا اضف
 و يتحقق وجود اليه ٥ ك فيرسب
 المنغنيس بلهب زنك تحقق وجود
 البورج بند ٥٩
 الكرومات لپوتاسيك
 بند ٦٦

في ماهية راسب الصف الخامس


(٧٢) قد رأينا ان كبريتيدات مواد الصف الثاني والثالث تولدت في السيلان المحمض بحامض هيدروكلوريك المستعمل لرسوب الصف الاول وقد قلنا ايضا انه لا بد من استعمال الحامض الهيدروكلوريك قبل استعمال الهيدروجين المكبرت حتى ولو لم توجد في السيلان مادة من مواد الصف الاول انظر بند ٢٢ والان نظهر سبب ذلك بقولنا انه لو لم نستعمل الحامض الهيدروكلوريك للسبب المذكور وكان السيلان قلوياً عند استخدام الهيدروجين المكبرت لرسبت مواد الصف الخامس هذه لان كبريتيداتها لا تذوب في السيلانات القلوية بل ترسب منها وكذلك لو لم نزيل الحامض الهيدروكلوريك قبل اضافة ماء النشادر اليه لرسبت مواد هذا الصف

اذا تولد راسب ايضاً عند اضافة الكبريتيد الامونيك يدل به على وجود الزنك

واذا تولد راسب ايضاً مصفرٌ يسمُرٌ بعرضه على الهوا يدل به على وجود منغانيس

واذا تولد راسب اسود يدل به على وجود الكوبلت او النكل او كليهما

ويجب ايضاً الفحص عن التوتيا والمنغانيس اللذان يخنفني
لونها بلون الراسب الاسود
واذا ذاب من راسب الاسود شي ثم في حامض هيدروكلوريك
مخفف بارد يعرف منه وجود المنغانيس او الزنك
او كليهما علاوة عن النكل
والكوبلت



الفصل السادس

في الصف السادس

وهو مركب من مواد معدنية لا تذوب كربوناتها في الماء ولا في القلويات حتى ولو وجد في السيل الكلوريد الامونيك

الفاعل العمومي الكربونات الامونيك

سميته (٥٤ ن) ٢ كرا



مثال رسوب عناصر الصف السادس

(٧٣) ضع في انبوبة ملعقة من مذوب كلوريد كل من
 السنرونسيوم (ست كل_٢) وكلسيوم (كل_٢) وباريوم (باكل_٢)
 وحمض السيلال بحامض هيدروكلوريك فلا يرسب راسب اضع
 اليه الحامض الهيدروكبريتيك فلا يتولد راسب ايضاً. اغل السيلال
 لطرده الحامض الهيدروكبريتيك واطف اليه الكلوريد الامونيك
 وماء النشادر فلا يرسب شي. ثم اغل السيلال واطف اليه وهو
 غال نقطتين من الهيدروكبريتيد الامونيك فلا يتولد راسب
 فقد تاكدت عدم وجود عنصر من عناصر الصفوف المار ذكرها
 وعدم تأثير فواعلها العمومية في عناصر هذا الصف. احم السيلال
 قليلاً واطف اليه الفاعل العمومي للصف السادس وهو الكربونات
 الامونيك فيرسب كربونات كل من السنرونسيوم والكلسيوم
 والباريوم على هيئة راسب ايض

في تحليل المزيج

(٧٤) رشح السيلال وصب على الراسب وهو في المرشحة ماء
 مقطراً مرتين او ثلاث مرات. ثم اضع اليه وهو بعد في المرشحة ما

يكفي لتذويبه من الحامض الخليك الخفف بالاحتراس من استعمال
أكثر مما يلزم

الكاشف الخاص للباريوم

(٧٥) خذ المذوب الناتج واغله ثم اضع اليه الكرومات
الپوتاسيك فيتولد راسب اصفر هو الكرومات الباريك وهكذا
لا تنزل تضيف الكاشف حتى لا يعود يتولد راسب ويكون السيلال
الذي هو فوق الراسب قد اصفر. رشح السيلال واحفظ المرشح للفحص
عن السترونتيوم والكلسيوم فتكون قد فرقت الباريوم
(تنبيه. قد يحدث ان الكرومات الباريك يرسب على هيئة
مسحوق دقيق حتى يصعب علينا تفريقه عن السيلال بالمرشحة
ولكن لا بد من تفريقه قبل الفحص عن السترونتيوم والكلسيوم
فلذلك اذا وجد راسب في المرشحة بعد الترشيح يجب تكرار الترشيح
حتى لا يبقى فيه راسب البتة)

كيفية تفريق السترونتيوم عن الكلسيوم
والكشف عنه

(٧٦) خذ المرشح الباقي بعد تفريق الباريوم واطفء اليه ماء

النشادر ما يجعله قلوياً ثم اضع اليه الكربونات الامونيك حتى لا يعود يتولد راسب. اغل المزيج دقيقة ورشحه ثم اغسل الراسب في المرشحة بماء حتى ينزع منه كل الكرومات البوتاسيك ويجري الماء عنه صافياً. ثم ذوبه في اقل ما يمكن من الحامض الخليك واضف الى هذا المذوب ثلاثة او اربعة اضعافه من مذوب الكبريتات البوتاسيك قوياً بالكفاة لرسوب الكبريتات السترونتيك وعدم رسوب الكبريتات الكلسيك (فلذلك يذوب جزء من الكبريتات البوتاسيك في مئتي جزء من الماء) اترك المزيج هادئاً مدة ساعتين او اكثر الى ان يتزل الكبريتات السترونتيك جميعه على هيئة راسب ثم رشحه فتكون قد فرقت السترونتيوم

اننا قد استعملنا الكربونات الامونيك ثانية بعد تفريق الباريوم لرسوب السترونتيوم والكلسيوم قبل استعمال الكبريتات البوتاسيك لتفريق السترونتيوم لان الكبريتات السترونتيك يذوب في سيال فيه الكرومات البوتاسيك فلذلك يرسب السترونتيوم والكلسيوم ثانية على هيئة كربوناتهما لازالة الكرومات البوتاسيك كما قد ذكر

اذا كان السترونتيوم والكلسيوم قليلين في المزيج فقد يحدث ان الراسب الحاصل من اضافة الكربونات الامونيك بعد تفريق

الكرومات الباريك بخني في السبال الاصفر فلا ينظره إلا المتعود
عليه فتنبه

الكاشف الخاص للكلسيوم

(٧٧) خذ المرشح بعد تفريق السنروتيوم واضف اليه ماء
النشادر ما يجعله قلوباً ثم صب عليه نصف ملعقة صغيرة من
مذوب الأكسالات الامونيك فحالاً يرسب الأكسالات الكلسيك
على هيئة راسب ابيض

في كيفية تفريق راسب الصف السادس

(٧٨) يرى ما تقدم ان تفريق الباريوم والسنروتيوم والكلسيوم
عن بعضها يتوقف على قضيتين
اولاً ان الكرومات الباريك لا يذوب في حامض خليك
مخفف بخلاف الكرومات السنروتيك والكلسيك اللذان
يذوبان فيه

ثانياً ان الكبريتات السنروتيك لا يذوب في ماء حمض
مخفف الكبريتات الكلسيك ان لم يكن الحامض الكبريتيك
زائداً

(٧٩) جدول يتضمن هيئة الطريقة السابق ايضاها

ان الفاعل العمومي للصف السادس (وهو الكربونات الامونيك) يرسب الباريوم والسترونتيوم والكلسيوم على هيئة كربوناتها. ذوب هذه الكربونات في حامض خليك مخفف واضف P_2O_5 و K_2O

فيرسب الكرومات ويبقى السترونتيوم والكلسيوم ذائبين اضف	الپوتاسيك على هيئة
راسب اصفر فاتح وذوبه في حامض خليك ثم اضف P_2O_5 و K_2O	هين ها و (هين) K_2O واجمع الراسب واغسله

فيرسب الكبريتات ويبقى كلس ذائبا	السترونتيك على
هيئة راسب ابيض بالاكسالات الامونيك	في السيلال ويرسب

ملاحظات خصوصية

(٨٠) اذا تولد راسب من سيال قلوي عند اضافة الكربونات الامونيك فيدل به على وجود الباريوم والسترونتيوم والكلسيوم كلها او بعضها غير انه يرسب مغنيسيوم ان وجد على هيئة كربوناته من سيال قلوي عند اضافة الكربونات الامونيك ان لم يوجد في السيال الكلوريد الامونيك يمنع رسوبه ويجب ايضاً ان يكون في السيال ماء النشادر لمنع انحلال الكربونات الباريك والسترونتيك والكلسيك بواسطة الكلوريد الامونيك ولكن يوجد الكلوريد الامونيك وماء النشادر في السيال اذا كنت قد سلكت على الطريقة المعينة لانك قد استعملت هذين الكاشفين في الفحص عن مواد الصف الرابع فها موجودان بعد في السيال عند الفحص عن الصف السادس . وبعد تدويب الراسب في الحامض الخليك واطافة الكرومات الپوتاسيك الى قسم من المذوب اذا تولد راسب يعرف بوجود الباريوم والا فلا يوجد باريوم في الراسب

ثم اذا تولد راسب بعد اضافة الكبريتات الپوتاسيك الى قسم آخر من المذوب في حامض خليك فيعرف وجود السترونتيوم والا فلا يوجد السترونتيوم

وإذا تولد راسب عند اضافة الاكسالات الامونيك الى قسم
 آخر من المذوب فيعرف وجود الكلسيوم
 تنبيه. اذا كان الحامض الهيدروكلوريك المستعمل يُرسب الصف
 الاول مخلوطاً بحامض كبريتيك فيرسب السنروتيوم والباريوم
 به كأنهما من الصف الاول وإذا كان في السبال الاصلي حامض
 نيتريك يتأكسد بعض الكبريت عند استعمال الهيدروجين
 المكبرت وإذا استعمل حامض نيتريك لتحويل الحديد الى ملح حديديك
 قبل طرد الهيدروجين المكبرت كله فيتولد حامض كبريتيك
 ويرسب السنروتيوم والكلسيوم في غير محلها فلذلك يجب استخدام
 حامض هيدروكلوريك صافي لرسوب الصف الاول وطرد
 الحامض النيتريك ان وجد من المرشح الباقي بعد تفريق الصف
 الاول بتجفيفه وتدويبه في حامض هيدروكلوريك ثم
 بتجفيف المذوب ثانية وتدويب الباقي في
 الماء المحمض بالحامض
 الهيدروكلوريك

الفصل السابع

في الصف السابع

وهو مركب من مواد معدنية لا ترسب بالفواعل العمومية للصفوف
المار ذكرها. وهي المغنيسيوم والصوديوم والپوتاسيوم

اما المغنيسيوم فيمنع رسوبه مع مواد الصف السادس
عند اضافة الكربونات الامونيك لسيال قلوبه
بالكلوريد الامونيك لان الكربونات المغنيسيك
يدوب في سيال فيه الكلوريد الامونيك

كيفية رسوب المغنيسيوم والكشف عنه

(٨١) خذ مذوب ملح من الأملاح المغنيسيك واضف اليه على الكيفية المذكورة في ما سبق حامضاً هيدروكلوريكاً وحامضاً هيدروكبريتيكاً وماء النشادر مع الكلوريد الامونيك والهيدروكبريتيد الامونيك والكربونات الامونيك فلا يتولد راسب ثم اضف اليه قليلاً من مذوب الفصفاة الصوديك وماء النشادر (كميات متعادلة منها) وهز المزيج من حين الى حين مدة ساعة او ساعتين فيرسب الفصفاة الامونيو- مغنيسيك على هيئة راسب ايض بلوري لا يدوب في القلويات بل يدوب في الحوامض

كيفية الفحص عن الصوديوم والپوتاسيوم

(٨٢) خذ ملح من املاح الصوديوم وملح من املاح الپوتاسيوم ورطبها بثلاث نقط او اربع من الماء ثم خذ شريطة من الپلاتين ونظفها تماماً بالماء وهيب البوري واتك طرفها الواحد وغطسها في المذوب وابقه في لهيب القنديل الكحولي فيصفر الלהيب من الصوديوم الموجود في المزيج ويخفي اللون المختص بالپوتاسيوم

بسبب لون الصوديوم ثم كرر العمل ولاحظ اللهب من وراء زجاجة
كوبلتية ملونة بلون ازرق وهي الزرقاء الاعيادية فيظهر لون
الپوتاسيوم البنفسجي ويخفي لون الصوديوم الاصفر بواسطة الزجاج
وبما انه يوجد اثر من الصوديوم والپوتاسيوم في المواد جميعها تقريباً
تعسر معرفة وجود الصوديوم والپوتاسيوم اصلاً في المادة تحت
الفحص او دخولها اليها عرضاً وقت الفحص غير ان الكشف عن
الصوديوم او الپوتاسيوم يمكن مطرداً

الكاشف الخاص للپوتاسيوم

(١٢) اذا اردت ان تتحقق وجود الپوتاسيوم خذ مذوب ملح
من املاح الپوتاسيوم واضف اليه نقطة او نقطتين من الحامض
الهيدروكلوريك وبعض النقط من مذوب الثاني كلوريد
الپلاتينيك فيتولد راسب اصفر بلوري هو الكلوروپلاتينات
الپوتاسيك اما الكلوريد الامونيك فيرْسب راسب اصفر بلوري
ايضاً من سيال خالياً من الپوتاسيوم على الاطلاق فلا بد والحالة
هذه من ازالة الكلوريد الامونيك بالتجفيف والاحراق كما سيذكر
قبل الكشف عن الپوتاسيوم

كيفية رسوب المغنيسيوم والكشف عنه

(٨١) خذ مذوب ملح من الاملاح المغنيسيك واضف اليه على الكيفية المذكورة في ما سبق حامضاً هيدروكلوريكاً وحامضاً هيدروكبريتيكاً وماء النشادر مع الكلوريد الامونيك والهيدروكبريتيد الامونيك والكربونات الامونيك فلا يتولد راسب ثم اضف اليه قليلاً من مذوب الفصفاة الصوديك وماء النشادر (كميات متعادلة منها) وهز المزيج من حين الى حين مدة ساعة او ساعتين فيرسب الفصفاة الامونيو - مغنيسيك على هيئة راسب ايض بلوري لا يذوب في القلويات بل يذوب في الحوامض

كيفية الفحص عن الصوديوم والپوتاسيوم

(٨٢) خذ ملح من املاح الصوديوم وملح من املاح الپوتاسيوم ورطبها بثلاث نقط او اربع من الماء ثم خذ شريطة من الپلاتين ونظفها تماماً بالماء وهيب البوري واتك طرفها الواحد وغطسه في المذوب وابعه في هيب القنديل الكحولي فيصفر اللهب من الصوديوم الموجود في المزيج ويخفي اللون المخلص بالپوتاسيوم

بسبب لون الصوديوم ثم كرر العمل ولاحظ اللهب من وراء زجاجة
كوبلتية ملونة بلون ازرق وهي الزرقاء الاعتيادية فيظهر لون
الپوتاسيوم البنفسجي ويخفي لون الصوديوم الاصفر بواسطة الزجاج
وبما انه يوجد اثر من الصوديوم والپوتاسيوم في المواد جميعها تقريباً
تعسر معرفة وجود الصوديوم والپوتاسيوم اصلاً في المادة تحت
الفحص او دخولها اليها عرضاً وقت الفحص غير ان الكشف عن
الصوديوم او الپوتاسيوم يمكن مطرداً

الكاشف الخاص للپوتاسيوم

(١٢) اذا اردت ان تتحقق وجود الپوتاسيوم خذ مذوب ملح
من املاح الپوتاسيوم واذف اليه نقطة او نقطتين من الحامض
الهيدروكلوريك وبعض النقط من مذوب الثاني كلوريد
الپلاتينيك فيتولد راسب اصفر بلوري هو الكلوروپلاتينات
الپوتاسيك اما الكلوريد الامونيك فيرُسب راسب اصفر بلوري
ايضاً من سيال خالياً من الپوتاسيوم على الاطلاق فلا بد والحالة
هذه من ازالة الكلوريد الامونيك بالتجفيف والاحراق كما سيذكر
قبل الكشف عن الپوتاسيوم

الكاشف الخاص للصوديوم

(٨٤) وإذا اردت ان تتحقق وجود الصوديوم اضع الى مذوب فيه الصوديوم نقطة او نقطتين من الحامض الهيدروكلوريك وبعض النقط من الثاني كلوريد الپلاتينيك ورشحه واجر مجرى من الهيدروجين المكبرت في المرشح ثم رشحه لتفريق الكبريتيد الپلاتينيك وجفف المرشح فيبقى الكلوريد الصوديك او عوضاً عن استعمال الهيدروجين المكبرت جفف المرشح الباقي بعد استعمال الثاني كلوريد الپلاتينيك بجمارة قليلة على قطعة پلاتين حتى تنشف جوانب السيل ثم انظر اليه بالمكروسكوب فترى بلورات الكلورو - پلاتينات الصوديك
 • الخصوصية على هيئة ابر طويلة دقيقة
 صفراء

الفصل الثامن

في ايضاح تفريق العناصر المعدنية الى الصفوف

(١٥) امزج في قديح مل = ملعقة صغيرة من كل من المذوبات
الآتية وهي

الكلوريدات النحاسية والحديدوس والزنك والكلسيك
والمغنيسيك والصوديك ومذوب الحامض الزرنيخوس بجامض
الهيدروكلوريك ثم اضف الى هذا المزيج قدره من الماء فان تولد
راسب او تعكر المزيج فاضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً نقطة

فقط حتى يروق فالمذوب اذ ذاك يجنوب على

عنصر من كل من الصفوف ما عدا

الصف الاول الذي قد

اوضحنا تفريقه

في ايضاح تفريق الصف الثاني والصف الثالث عن الصفوف الأخر

(١٦) اجر مجرى من الهيدروجين المكبرت في المذوب المعد فيتولد حالاً راسب كثيف معتم اللون يزداد تدريجياً بالحجم ولما يكون الغاز قد جرى مدة خمس او عشر دقائق وقف المجرى وحرك المذوب واطرد الهيدروجين المكبرت الزائد بالنفخ فان بقيت رائحة في السبال مدة دقيقتين يكون قد استعمل كفاءة منه وان لم تبق يجب تكرار العمل

صب السبال والراسب معاً في مرشحة تختمها قرح واغسل الوعاء الذي كان فيه السائل وصب ما فيه في المرشحة وبعد ترشيحه ضع فيها قليلاً من الماء حتى يتم الترشيح وضع المرشح على جانب. اما الراسب فيدل على الصف الثاني والثالث

في تفريق الصف الثاني عن الصف الثالث

(١٧) خذ الراسب من المرشحة وهو الكبريتيد النحاسيك والكبريتيد الزرنيخيك اللذان لا ينوبان في السائلات المحمضة إلا قليلاً ولا في الماء (ويختلفان في ذوبانها في القلويات كما مر) وضعه في صحن صيني وصب عليه من الهيدرات الصوديك

(مذوب صودا كاوي) ما يكفي لان بغمره واحترس من ان تزيد الحد. احم المذوب وحركه حركة دائمة بفضيب زجاج فيذوب بعض الراسب ويبقى البعض الاخر غير ذائب. رشح السبال الحامي فيكون الراسب الباقي في المرشحة هو الكبريتيد النحاسيك الذي لا يذوب في الماء ولا في الحوامض المخففة ولا في السائلات القلوية فيدل على الصف الثاني. خذ المرشح الباقي بعد تفريق النحاس واضف اليه حامضاً هيدروكلوريكاً حتى يجمر السبال وورق الثموس فيتولد راسب اصفر حالما تنزع قلوية السبال ويكون الراسب المحاصل الكبريتيد الزرنيخك القابل الذوبان في القلويات ولذلك يختلف عن الكبريتيد النحاسيك فيدل على الصف الثالث الذي لا يذوب كبريتيد عناصره في الماء ولا في الحوامض ويذوب في القلويات

في ايضاح تفريق الصف الرابع

(٨٨) صب المرشح الباقي بعد تفريق الصنفين الثاني والثالث بواسطة الهيدروجين المكبرت في صحن واغله بضع دقائق لطرد الهيدروجين المكبرت ولتحقق طرد كل الغاز خذ قطعة ورق مبتلة بالنيترات الرصاصيك وابتها فوق السائل في حالة الغليان فان دامت الورقة بيضاء دلت على عدم وجود الهيدروجين المكبرت

جدول يتضمن الصفوف أ

اضف للمذوب تحت الفحص وهو

اجر في المرشح الهيد

فيرسب الرصاص

والفضة والزيق

بند ١٧

اغلي المرشح
الحديد

اغلي الراسب مع الهيدرات الصوديك

فلا يذوب الزبيق	ويذوب الزرنج	فيرسب
والرصاص والبرموث	والقصدير والاشيمون	والكرو
والكدميوم والنحاس	والذهب والپلاتين	(وقد
ويكشف عنها في	ويكشف عنها في	آخر) به
الراسب بند ٣٦	المرشح بند ٤٧	

وكيفية تفريقها عن بعضها

حامضاً هيدروكلوريكاً مخففاً

من المكبرت و فرق الراسب عن السيل

لذا لازالة كل الهيدروجين المكبرت واضف اليه حامضاً نيتريكاً لتاكسد
ب الكلوريد الامونيك وماء النشادر

اضف للمرشح قليلاً من الهيدوكبريتيك الامونيك		الحديد لومينوم مواد
اضف للمرشح الكربونات الامونيك		
فيرسب الباريوم والسترونتيوم والكلسيوم بند ١٠	جفف المرشح الباقي واكشف في بعضه عن المغنيسيوم ثم اكشف في البعض الاخر عن الپوتاسيوم والصوديوم فصل ٧	فيرسب الكوبلت والنكل والزنك (وقد يرسب المنغنيس) بند ١٢

القسم الثاني

في كيفية تفریق المواد غير المعدنية الى صفوف
وطريقة الكشف عنها

(٩٢) تُعرف المواد غير المعدنية بواسطة مركباتها كالمواد المعدنية غير أنه يوجد فرق عظيم بين الكشف عن العناصر المعدنية وغير المعدنية لان التصد في الكشف عن الاولى معرفة وجودها بدون التفات الى كيفية تركيبها ويستثنى من ذلك الحديد الموجود على هيئة ملح حديديك وملح حديدوس والزئبق الموجود على هيئة ملح زئبتيك وملح زئبقوس ولكن يُقصد في الكشف عن العناصر غير المعدنية مع معرفة وجودها معرفة تركيبها فيكشف عن الصوديوم مثلاً بطريقة واحدة سواء كان على هيئة كبريتاته

او كبريتته او هيوكبريتته ولكن يجب عند الكشف عن الكبريت
 ان نعرف اذا كان موجوداً على هيئة كبريتات او كبريتت او
 هيوكبريتت او كبريتيد لان كلاً من الكبريتات والكبريتت
 والهيوكبريتت والكبريتت يفعل في الكواشف فعلاً خاصاً
 واذ كانت المواد غير المعدنية توجد غالباً مركبة مع الاكسجين
 او الهيدروجين على هيئة حامض فالكواشف عن الحوامض هي
 الكواشف عن المواد غير المعدنية. فالكشف عن الحامض
 الكبريتيك مثلاً هو الكشف عن الكبريت والاكسجين.
 والكشف عن الحامض الهيدروكلوريك
 هو الكشف عن الكلور
 والهيدروجين وقس
 عليه



في الفصل الأول

في الصف الأول

(٦٢) وهو مركب من الحوامض التي تكشف عنها بين المواد
المعدنية

وهي الحامض الزرنيخوس

الحامض الزرنيغيك

الحامض الكروميك

فللكشف عن الزرنيخ انظر بند ٢٩ وجه ٦٢

وللتمييز بين الزرنيجات والزرنيغيت انظر بند ٤٠ وجه ٦٥

وللكشف عن الحامض الكروميك انظر بند ٥٢ وجه ٧٨

ثانياً الحوامض غير حوامض الصف الاول التي تولد مع

الباريوم املاح تذوب في سيال محمض وهي

الحامض النصفوريك على هيئة النصفات الباريك وهو ابيض

الهيدروفلوريك " " الفلوريد " " " "

البوريك " " البورات " " " "

السليسيك " " السليكات " " " "

الكربونيك " " الكربونات " " " "

الاكساليك " " الاكسالات " " ابيض

ثالثاً الحامض الكبريتيك على هيئة الكبريتات الباريك وهو

ابيض ولا يذوب في سيالات محمضة

(٩٥) اذا تحققنا وجود الزرنج او الكروم في الكشف عن

المواد المعدنية يلزم تفريقه على هذه الطريقة

حمض السيال قليلاً (اذا كان متعادلاً او قلوياً) بحامض

النيتريك واجر فيه الهيدروجين المكثرت بالزيادة . رشح السيال

لتفريق الزرنج ان وجد واغل المرشح لازالة الهيدروجين المكثرت

واجعله متعادلاً بماء الشادر ورشحه

وكذلك اذا تحققنا وجود الحامض الكربونيك نزيلة بغليانه قليلاً

بعد اضافة حامض نيتريك ثم نجعل السيال متعادلاً بماء الشادر

اضف للسيال المتعادل الباقي بعد تفريق هذه الحوامض الكلوريد الباريك (او النترات الباريك اذا وُجد في السيال ملح من الاملاح الفضيك او الزيقوس) فاذا لم يتولد راسب يدل على عدم وجود حوامض هذا الصنف الا الحوامض التي فرقناها اذا تولد راسب اضف للسيال حامضاً هيدروكلوريكاً مخففاً (او حامضاً نيتريكاً مخففاً اذا استخدمت النترات الباريك لترسب الاملاح) واذا ذاب كل الراسب او البعض منه فيدل على وجود ملح من الاملاح المذكورة في هذا الصنف وان لم يذب يدل على وجود كبريتات فقط


(تنبيه . ان بورات الباريوم واكسالته وفلوريده تُذوب في سيالات فيها املاح الامونيوم فانتهبه)



الفصل الثالث

في الصف الثالث

وهو مركب من الحوامض التي ترسب بالنترات الفضيكية وهي
على قسمين



(٩٦) القسم الأول مركب من حوامض ترسب من سيال
متعادل بالنترات الفضيكية وهي

الحامض الزرنيخيك على هيئة راسب اسمر محمر الزرنيخات الفضيكية

” الزرنيخوس ” ” ” ” اصفر الزرنيخيت ”

” الكروميك ” ” ” ” احمر الكرومات ”

اي حوامض الصف الاول

الحامض النصفوريك	على هيئة راسب اصفر	النصفك الفضيك
" السليسبيك "	" " " "	" اصغراواييض السلكات "
" الأوكساليك "	" " " "	" الأوكسالات "
" الهيدروفلوريك "	" " " "	" الفلوريك "
" البوريك "	" " " "	" البورات "
" الكربونيك "	" " " "	" الكربونات "

أي حوامض الصنف الثاني ما عدا الكبريتات

القسم الثاني ما يرسب من سيال متعادل ومحض بالنترات

الفضيک

كل كبريتيد على هيئة راسب اسود	الكبريتيد الفضيک
" بروميد " " "	" ايض مضفر البروميد "
" يوديک " " "	" اصفر اليوديک "
" كلوريديک " " "	" ايض الكلوريک "

(ويرسب السيانيد اذا لم يوجد زبيق في السيال)

(٩٧) قبل استعمال النترات الفضيک يجب تفريق الصنف

الاول من المواد غير المعدنية اي الحامض الزرنيخوس والحامض

الزرنيخيك والحامض الكروميک على الكيفية المذكورة بند

٩٥ بواسطة حامض نيتريك وحامض هيدروكبريتيك ثم

اغل المرشح بلطف لازالة الحامض الهيدروكبريتيك والحامض
 الكربونيك ويجب ايضاً تحويل ملح حديدوس ان وجد الى ملح
 حديدك وذلك بغليان السيال بعد اضافة نقط قليلة من
 الحامض النيتريك لان الكبريتات الحديدوس يرسب الفضة. ثم
 اضف للسيال ماء النشادر بالزيادة واغله حتى يصير متعادلاً.
 اذا تولد راسب رش السيال لتفريقه واضف للمرشح مذوب
 النترات الفضيك واذا صار السيال جامضاً بعد اضافة النترات
 اجعله متعادلاً بماء النشادر بلطافة

اذا لم يتولد راسب يدل على عدم وجود حامض من حوامض
 هذا الصف ما عدا الحوامض التي فرقناها

اذا تولد راسب لاحظ لونه ثم اضف حامضاً نيتريكاً صافياً
 واذا ذاب فيدل على وجود حامض من حوامض القسم الاول
 من هذا الصف واذا لم يذب فيدل على وجود

كبريتيد او كلوريد او بروميد او

يوديد

الفصل الرابع

في الصف الرابع

(٩٨) وهو مركب من الحوامض التي تذوب املاحها في
الماء وفي سيالات محبضة وفي قلوبات



وهي الحامض النيتريك

الحامض الكلوريك

الحامض الخليك

وبما ان املاح هذه الحوامض تذوب جميعها فلا يكشف عنها
برسوبها بل بكواشف خصوصية

الفصل الخامس

في الكواشف الخصوصية عن المواد غير المعدنية

(١٩٦-) ان اخذنا مذوب كربونات وسيانيد وكبريتيد وكبريتيت وهيبوكبريتيت جميعها معاً او واحد منها فقط يحدث فوران وتتصعد غاز عند اضافة حامض هيدروكلوريك اليه واحماؤه بجمارة قليلة فكل الغازات المتولدة عديمة اللون وكل منها ذورائحة خصوصية الا الحامض الكربونيك الذي يصعد عن الكربونات اما السيانيد فينبع رائحة حريفة والكبريتيد يولد هيدروجيناً مكبرتاً يعرف برائحته بسهولة والكبريتيت والهيبوكبريتيت يولدان حامضاً كبريتوساً يعرف بسهولة من رائحته غير ان الهيبوكبريتيت يرسب علاقة على الحامض الكبريتوس كبريتاً فاذا وجد في المذوب ملح واحد فقط من الاملاح المذكورة انفاً يعرف بالفوران والرائحة او عدما واذا كان في المذوب اكثر من ملح واحد يلزم لذلك كواشف خصوصية

الكاشف للكربونات

(١٠٠) اضع لمذوب كربونات ما (مذوب الكربونات الصوديك مثلاً) حامضاً هيدروكلوريكاً بزيادة ثم سد الانبوبة بالابهام حتى يتجمع الغاز فيها ثم اجر الغاز في انبوبة اخرى داخلها ماء الكلس محترساً من ان يدخلها سائل وهز الانبوبة الثانية فيرسب الكربونات الكلسيك ان كان الغاز حامضاً كربونيكاً واذا كان الفوران والغاز الصاعد قليلين فخذ قضيب زجاج معتم اللون وغطسه في ماء الكلس ثم ضعه في الانبوبة (التي فيها مذوب الكربونات) بالقرب من سطح السيال فان تصعد غاز الحامض الكربونيك من السيال يتعكر الماء المتصق بقضيب الزجاج

الكاشف للسيانيد

(١٠١) اذا ظن بسبب رائحة الغاز الصاعد عند الفوران انه ناتج عن السيانيد نتحقق وجوده على الكيفية الآتية. اضع الى مذوب السيانيد البوتاسيك مثلاً نقطاً قليلة من المذوب المحنوي على ملحي الحديدوس والحديدك وقليلاً من صودا كاو فيرسب راسب وهو اخضر مزرق اي الهيدرات الحديدك ويبقى البعض الآخر بلون ازرق وان كان السيانوجين قليلاً يخف اللون الازرق الى

ثانياً الحوامض غير حوامض الصف الاول التي تولد مع

الباريوم املاح تذوب في سيال حمض وهي

الحمض النصفوريك على هيئة الفصافات الباريك وهو ايض

" الهيدروفلوريك " " الفلوريد " " " "

" البوريك " " البورات " " " "

" السليسيك " " السليكات " " " "

" الكربونيك " " الكربونات " " " "

" الاكساليك " " الاكسالات " " ايض "

ثالثاً الحامض الكبريتيك على هيئة الكبريتات الباريك وهو

ايض ولا يذوب في سيالات محمضة

(٩٥) اذا تحققنا وجود الزرنج او الكروم في الكشف عن

المواد المعدنية يلزم تفرقة على هذه الطريقة

حمض السيال قليلاً (اذا كان متعادلاً او قلوياً) بحامض

النيتريك واجر فيه الهيدروجين المكثرت بالزيادة . رشح السيال

لتفريق الزرنج ان وجد واغل المرشح لازالة الهيدروجين المكثرت


واجعله متعادلاً بماء النشادر ورشحه

وكذلك اذا تحققنا وجود الحامض الكربونيك نزيله بغليانه قليلاً

بعد اضافة حامض نيتريك ثم نجعل السيال متعادلاً بماء النشادر

اضف للسيال المتعادل الباقي بعد تفريق هذه الحوامض الكلوريد الباريك (او النترات الباريك اذا وُجد في السيال ملح من الاملاح الفضيك او الزيفوس) فاذا لم يتولد راسب يدل على عدم وجود حوامض هذا الصنف الا الحوامض التي فرقناها اذا تولد راسب اضف للسيال حامضاً هيدروكلوريكاً مخففاً (او حامضاً نيتريكاً مخففاً اذا استخدمت النترات الباريك لترسب الاملاح) واذا ذاب كل الراسب او البعض منه فيدل على وجود ملح من الاملاح المذكورة في هذا الصنف وان لم يذب يدل على وجود كبريتات فقط

(تنبيه . ان بورات الباريوم واكسالته وفلوريده تُذوب في سيالات فيها املاح الامونيوم فانتهبه)



الفصل الثالث

في الصف الثالث

وهو مركب من الحوامض التي ترسب بالنيترات الفضيكية وهي
على قسمين



(٩٦) القسم الأول مركب من حوامض ترسب من سيال
متعادل بالنيترات الفضيكية وهي
الحامض الزرنيخيك على هيئة راسب اسمر محمر الزرنيخات الفضيكية
" الزرنيخوس " " " " اصفر الزرنيخيت
" الكروميك " " " احمر الكرومات
اي حوامض الصف الاول

الحامض النصفوريك	على هيئة راسب اصفر	النصفاك الفضيك
" السليسيك "	" " " "	" اصغراو ايض السلكات "
" الاكساليك "	" " " "	" الاكسالات "
" الهيدروفلوريك "	" " " "	" الفلوريد "
" البوريك "	" " " "	" البورات "
" الكربونيك "	" " " "	" الكربونات "

أي حوامض الصف الثاني ما عدا الكبريتات

القسم الثاني ما يرسب من سيال متعادل ومحض بالنترات

الفضيک

كل كبريتيد على هيئة راسب اسود	الكبريتيد الفضيک
" بروميد " " "	" ايض مضفر البروميد "
" يوديک " " "	" اصفر اليوديک "
" كلوريد " " "	" ايض الكلوريد "

(ويرسب السيانيد اذا لم يوجد زبيق في السيال)

(٩٧) قبل استعمال النترات الفضيک يجب تفريق الصف

الاول من المواد غير المعدنية اي الحامض الزرنيخوس والحامض

الزرنيخيك والحامض الكروميك على الكيفية المذكورة بند

٩٥ بواسطة حامض نيتريك وحامض هيدروكبريتيك ثم

اغل المرشح بلطف لازالة الحامض الهيدروكبريتيك والحامض
الكربونيك ويجب ايضاً تحويل ملح حديدوس ان وجد الى ملح
حديدك وذلك بغليان السيال بعد اضافة نقط قليلة من
الحامض النيتريك لان الكبريتات الحديدوس يرسب الفضة. ثم
اضف للسيال ماء النشادر بالزيادة واغله حتى يصير متعادلاً.
اذا تولد راسب رشح السيال لتفريقه واضف للمرشح مذوب
النترات الفضيك واذا صار السيال حامضاً بعد اضافة النترات
اجعله متعادلاً بماء النشادر بلطافة.

اذا لم يتولد راسب يدل على عدم وجود حامض من حوامض
هذا الصف ما عدا الحوامض التي فرقناها

اذا تولد راسب لاحظ لونه ثم اضف حامضاً نيتريكاً صافياً
واذا ذاب فيدل على وجود حامض من حوامض القسم الاول

من هذا الصف واذا لم يذب فيدل على وجود


كبريتيد او كلوريد او بروميد او

يوديد

الفصل الرابع

في الصف الرابع

(٩٨) وهو مركَّبٌ من الحوامض التي تذوب املاحها في
الماء وفي سيالات محبضة وفي قلوبات



وهي الحامض النيتريك

الحامض الكلوريك

الحامض الخليك

وبما ان املاح هذه الحوامض تذوب جميعها فلا يكشف عنها
برسونيه كما كشف خصوصية

اغل المرشح بلطف لازالة الحامض الهيدروكبريتيك والحامض
الكاربونيك ويجب ايضاً تحويل ملح حديدوس ان وجد الى ملح
حديدك وذلك بغليان السيال بعد اضافة نقط قليلة من
الحامض النيتريك لان الكبريتات الحديدوس يرسب الفضة. ثم
اضف للسيال ماء النشادر بالزيادة واغله حتى يصير متعادلاً.
اذا تولد راسب رشح السيال لتفريقه واضف للمرشح مذوب
النترات الفضيك واذا صار السيال جامضاً بعد اضافة النترات
اجعله متعادلاً بماء النشادر بلطافة.

اذا لم يتولد راسب يدل على عدم وجود حامض من حوامض
هذا الصف باعد الحوامض التي فرقناها

اذا تولد راسب لاحظ لونه ثم اضف حامضاً نيتريكاً صافياً
واذا ذاب فيدل على وجود حامض من حوامض القسم الاول
من هذا الصف واذا لم يذب فيدل على وجود

كبريتيد او كلوريد او بروميد او

يوديد

الفصل الرابع

في الصف الرابع

(٩٨) وهو مركَّب من الحوامض التي تذوب املاحها في
الماء وفي سيالات محبضة وفي قلوبات



وهي الحامض النيتريك

الحامض الكلوريك

الحامض الخليك

وبما ان املاح هذه الحوامض تذوب جميعها فلا يكشف عنها
برسوبها بل بكواشف خصوصية

الفصل الخامس

في الكواشف الخصوصية عن المواد غير المعدنية

(٩٩) ان اخذنا مذوب كربونات وسيانيد وكبريتيد وكبريتيت وهيبوكبريتيت جميعها معاً او واحد منها فقط يحدث فوران ويتصعد غاز عند اضافة حامض هيدروكلوريك اليه واحمائه بجملة قليلة فكل الغازات المتولدة عديمة اللون وكل منها ذرات راتحة خصوصية الا الحامض الكربونيك الذي يصعد عن الكربونات اما السيانيد فينبغ رائحة حريفة والكبريتيد يولد هيدروجيناً مكبرتاً يعرف برائحته بسهولة والكبريتيت والهيبوكبريتيت يولدان حامضاً كبريتوساً يعرف بسهولة من رائحته غير ان الهيبوكبريتيت يرسب علاوة على الحامض الكبريتوس كبريتاً فاذا وجد في المذوب ملح واحد فقط من الاملاح المذكورة انفاً يعرف بالفوران والرائحة او عدمها واذا كان في المذوب اكثر من ملح واحد يلزم لذلك كواشف خصوصية

الكاشف للكربونات

(١٠٠) اضعف لمذوب كربونات ما (مذوب الكربونات الصوديك مثلاً) حامضاً هيدروكلوريكاً بزيادة ثم سد الانبوبة بالابهام حتى يتجمع الغاز فيها ثم اجر الغاز في انبوبة اخرى داخلها ماء الكلس محترساً من ان يدخلها سائل وهز الانبوبة الثانية فيرسب الكربونات الكلسيك ان كان الغاز حامضاً كربونيكاً واذا كان الفوران والغاز الصاعد قليلين فخذ قضيب زجاج معتم اللون وغطسه في ماء الكلس ثم ضعه في الانبوبة (التي فيها مذوب الكربونات) بالقرب من سطح السيال فان تصعد غاز الحامض الكربونيك من السيال يتعكر الماء المتصق بقضيب الزجاج

الكاشف للسيانيد

(١٠١) اذا ظن بسبب رائحة الغاز الصاعد عند الفوران انه ناتج عن السيانيد نتحقق وجوده على الكيفية الآتية. اضعف الى مذوب السيانيد البوتاسيك مثلاً نقطاً قليلة من المذوب المحنوي على ملح الحديدوس والحديدك وقليلاً من صودا كاو فيرسب راسب وهو اخضر مزرق اي الهيدرات الحديدك ويبقى البعض الآخر بلون ازرق وان كان السيانوجين قليلاً يخف اللون الازرق الى

ان يضاف الحامض وقد يخضر السيل قليلاً بعد استعمال
الحامض ويزرق الراسب بعد وقت طويل
وإذا كان السيانيد مركباً مع زبيق يجب ارساب الزبيق بواسطة
هيدروجين مكبرت قبل الكشف عن السيانيد

الكاشف للكبريتيد

(١٠٢) ان الحامض الهيدرروكبريتيك (الهيدروجين
المكبرت) يتولد من عدة كبريتيدات عند ما نحى مع حامض
هيدر وكلوريك فاذا كان الغاز قليلاً حتى لا تنفوح رائحة خصوصية
يستعمل له الكاشف بورق مبلول بمذوب ملح من املاح الرصاص
وإذا ذوب كبريتيد في حامض نيتريك او في ماء الذهب يفرق
الكبريتت على هيئة كبريت وحامض كبريتيك فيعرف الكبريت
من ظواهره ويكشف عن الحامض الكبريتيك بحسب بند ١٠٧

الكاشف للكبريتات

(١٠٣) ان جميع انواع الكبريتات تولد حامضاً كبريتوساً
بلا رسوب كبريت عند استعمال الحامض الهيدروكلوريك
ويُعرف الغاز من رائحته كما مرّ. اما النترات الفضيكة فيولد راسباً

ايض في مذوب كبريتيت ما فيسود الراسب عند غليانه ويتحول الكبريتيت الى كبريتات بدون رسوب الكبريت عند غليانه مع حامض نيتريك قوي فيكشف عن الكبريتات بحسب بند ١٠٧

الكاشف للهيوكبريتيت

(١٠٤) ان الهيوكبريتيت يولد حامضاً كبريتوساً ويرسب كبريتاً عند احماؤه مع حامض هيدروكلوريك ولا يصير هذا التحويل حالاً ان لم يكن المذوب مخففاً. اما النترات الفضيكة فيولد راسباً في مذوب الهيوكبريتيت يذوب بزيادة الهيوكبريتيت ويسود عند احماؤه

الكاشف للكرومات

(١٠٥) يعرف الكروم حين الفحص عن العناصر المعدنية اذا كان موجوداً في المادة تحت الفحص فللكشف عنه انظر بند ٥٢

التمييز بين الزرنيخت والزرنيخات

(١٠٦) يعرف وجود الزرنيخ او عدم وجوده حين الكشف عن العناصر المعدنية كما ذكر غير ان الملح يبقى غير معروف أهو زرنيخت ام زرنيخات فيقتضي كواشف اخرى للتمييز بينها فيمتاز الزرنيخت عن الزرنيخات بكون النترات الفضيكة

يولد راسباً اصفر مع مذوب زرينجيت وراسباً احمر مسمراً مع الزرينجات غير انه لا يمكن استعمال النترات الفضيكة في كل الاحوال فلذلك يمتاز الزرينجيت عن الزرينجات بالكييفية المذكورة في بند ٤٠ وجه ٦٥

الكاشف للكبريتات

(١٠٧) يعرف وجود الكبريتات بواسطة الكشف بالباريوم بند ٩٤ لان الكبريتات الباريك لا يذوب في سيال محمض وبه كفاءة ولكن يجب ان نتأكد عدم وجود الحامض الكبريتيك في الكواشف المستخدمة وعلى الاخص في الحامض الهيدروكلوريك

الكاشف للفوسفات

(١٠٨) بعد فحص المواد المعدنية ان كنا قد تحققنا عدم وجود الحامض الزرينجيك او زرينجات ما في المذوب تحت الفحص يكشف عن الفوسفات او الحامض الفسفوريك بالطريقة الآتية اذ يضاف الى السيل مذوباً صافياً من الكبريتات المغنيسيك والكلوريد الامونيك وماء النشادر فاذا وجد فوسفات او حامض فسفوريك يتولد راسب ابيض بلوري يذوب في الحوامض

اما اذا وجد حامض زرنينيك او زرنينجات ما فيجب ازالة
الزرننج بهيدروجين مكبرت (كما ذكر بند ٩٥) قبل الكشف
عن الفصفاة ثم يستعمل المزيج السابق ذكره للكشف عن
الفصفاة ويوجد ايضاً كاشف آخر يستعمل في كل الاحوال
وهو الآتي . ضع في انبوبة اربع او خمس ملاعق من مذوب
المولبدات الامونيك في حامض نيتريك واضف اليها نقطتين او
ثلاث من مذوب مجنوي على الفصفاة فيرسب اذا كان بارداً
راسب اصفر فاتح يجمع على جوانب الانبوبة وقعرها وان لم يتولد
راسب بعد حين فاضف بعض نقط من المذوب المجنوي على
الفصفاة وينوب الراسب بزيادة الحامض الفسفوريك . اذا
اصفر السيل فقط فلا يدل على وجود الفصفاة بتاكيد ولا بد
من تولد راسب اصفر . اما استعمال الحرارة لهذا الكشف فلا
يسوغ

الكاشف للأكسالات

(١٠٩) يرسب الأكسالات الباريك من مذوب مجنوي على
الأكسالات بواسطة املاح الباريوم وعلاوة على ذلك اذا احمينا
حامضاً أكساليكاً او أكسالاتاً ما في انبوبة مع حامض كبريتيك

يفلت حامض كربونيك بفوران ويكشف عنه حسبما ذكر بند ١٠٠
 ويفلت أكسيد الكربون الذي يمكن اشعاله وإذا كان الحامض
 قليلاً خذ قليلاً من مذوب الكربونات الصوديك واضف اليه
 المذوب الذي فيه الحامض الأكساليك أو الأكسالات فيرسب
 الأكسالات الكلسيك الذي لا يذوب في حامض خليك

الكاشف للطرطرات

(١١٠) إذا احينا حامضاً طرطريكاً أو طرطراتاً ما تفوح عنه
 رائحة خصوصية تشبه رائحة السكر المحروق وإذا صبَّ حامض
 كبريتيك عليه يسود (ان بعض الاملاح تسود في مثل هذه
 الاحوال ولا ذكر للمخ منها في هذا الكتاب سوى الطرطرات).
 ولنتحقق وجود الحامض الطرطريك او طرطرات ما في سيال اضف
 للسيال مذوب الخلات البوتاسيك قوياً وهز المزيج هزاً جيداً
 فيرسب ان وجد الطرطرات راسب هو الطرطرات البوتاسيك
 الذي يذوب بصعوبة. اذا اضفنا الكحول للمزيج يزيد الكشف
 تأكيداً. اما المذوب المستعمل هنا ككاشف فيستحضر حين استخدامه
 على هذه الكيفية امزج نصف ملعقة صغيرة من الكربونات
 البوتاسيك وبعض النقط من الحامض الخليك كافية لان تذوب
 ثلاثة ارباع الكربونات ورشَّ المزيج واستخدم المرشح

الكاشف للبورات

(١١١) ليتحقق وجود البورات امزج المادة تحت الفحص مع ما يكفي ليخترها من الحامض الكبريتيك القوي ثم اضف اليه قدره من الكحول واحرقه فيتولد لهيب اخضر مصفر كرر اطفاء اللهب واشعالة حتى يتحقق وجود البورات اما املاح النحاس فتلون لهيب الكحول بلون يقارب هذا اللون غير انه يمكن ازالة النحاس بالهيدروجين المكثرت قبل الكشف عن البورات

وقد يكشف عن البورات ايضا على هذه الطريقة امزج مذوب بورات ما بما يكفي ليحمضه من الحامض الهيدروكلوريك . ثم غط ورق الترميك الى نصفه في المزيج ونشفه الى حرارة ٢١٢° ف يتلون النصف الذي غط في السبال بلون احمر خصوصي .
فالكاشف المذكور كاشف دقيق

الكاشف للسليكات

(١١٢) السليكات لاتذوب في الماء ما عدا السليكات الصوديك والسليكات الپوتاسيك فاذا اضفنا حامضاً هيدروكلوريكاً لمذوب السليكات الصوديك والسليكات

الپوتاسيک یرسب الحامض السليسيک علی هيئة راسب لزج
 وإذا مزجنا السليکات الصوديک والپوتاسيک مع حامض
 هيدروکلوريک او نيتريک ثم جففناه يفرق الحامض السليسيک
 ثم اذا احرقناه وصيننا علی الباقي حامضاً هيدروکلوريکاً مخففاً او
 حامضاً نيتريکاً مخففاً تذوب کل المادة ما عدا الحامض السليسيک
 الذي يبقی علی هيئة مسحوق ايض خشن وإذا اضفنا الكلوريد
 الامونيک الی مذوب السليکات الصوديک او الپوتاسيک يتولد
 راسب لزج هو حامض سليسيک . ويكشف عن الحامض
 السليسيک بالكاشف الثاني عن الفلور انظر بند ١١٢

الكاشف للفلوريد

(١١٢) اذا احمينا مسحوق فلوريد ما مع حامض كبريتيک
 قوي في بوظقة رصاصية او پلاتينية يتولد حامض هيدروفلوريک
 خذ قطعة زجاج تكفي لتغطي فوهة البوظقة واحمها باحتراس
 واكسها شمعاً وهي حامية ثم اكتب علی الشمع كلمة بشي مروس
 يصل الی الزجاج وغط البوظقة بزجاج سطحه المكسو شمعاً الی
 اسفل ثم احم البوظقة بلطافة مقدار نصف ساعة او ساعة وانزع

الزجاج واحم قليلاً حتى يُزال عنه الشمع فتبدولك الكلمة المكتتبه
موترة على الزجاج

ثانياً امزج مادة يظن انها تخنوي على الفلوريد برمل دقيق
ناشف او سليكات ما واحم المزيج في انبوبة ناشفة قصيرة مع
حامض كبريتيك قوي ثم التقط نقطة من الماء بشريط من
الپلاتين منثن وابها عند فوهة الانبوبة فتكمد النقطة او تصير
مظلمة او صلبة بالنسبة الى كثرة فلوريد السليكون المتولد او قلته

الكاشف للكلوريد

(١١٤) احم المادة المظنون انها تخنوي على الكلوريد في انبوبة
مع الثاني اكسيد المنغنيك وحامض كبريتيك قوي فيتولد الكلور
ان وُجد كلوريد ويعرف برائحته ولونه الاصفر المخضر
ثانياً احم كلوريداً ما مع الكرومات الپوتاسيك الصافي
وحامض كبريتيك قوي فيتولد غاز اسمر يتكثف ويصير سيالاً
احمر وان اضيف اليه ماء النشادر بزيادة يتحول اللون الى لون
اصفر من تولد (٥٤ ن) كروا_٢ ثم اذا اضيف اليه حامض يتولد
(٥٤ ن) كروا_٢ لونه اصفر محمر

الكاشف للبروميد

(١١٥) احم بروميداً مع حامض نيتريك فيتلون السيال بلون اصفر اذا كان البروميد مذوباً وان كان جامداً ينفرد على هيئة بخار اصفر مسمر يتجمع على جدران الانبوبة الباردة على هيئة سيال هذا ان لم يكن البروم مركباً مع الفضة او الزينق
 اذا احمي بروميد في انبوبة مع الثاني اكسيد المنغنك او الكرومات الپوتاسيك وحامض كبريتيك قوي تتولد البخرة حمراء مسمرّة واذا وُجد كلور ايضاً يمتزج مع البروم فيمتاز البروم اذذاك عن الكلور بواسطة قضيب زجاج يغطس في مذوب النشا ويبقى في اعلى الانبوبة من حيث تتصعد البخرة التي اذا وُجد فيها بروم يصفّر النشا

الكاشف لليوديد

(١١٦) اذا احمينا يوديداً ما مع حامض نيتريك قوي ينفرد اليود على هيئة البخرة بنفسجية يكشف عنها بقضيب من زجاج مغطس في مذوب نشا رطب فيزرق النشا اذا وُجد اليود وان ظن بوجود اليود في مذوب ما فاضف اليه قليلاً من مذوب

النشائم من الحامض الهيدروكلوريك المخفف او الحامض الكبريتيك المخفف حتى يصير حامضاً ثم نقطة او نقطتين من مذوب النيريت الهوتاسيك القوي فيتلون السبال بلون ازرق غامق اذا وُجد يود فيه هذا اذا كان السبال بارداً لان الحرارة تزيل اللون. وينفرد اليود ايضاً باحائه مع الثاني اكسيد المنغنيك وحامض كبريتيك كما ينفرد الكلور والبروم فيعرف بلونه

الكاشف للنترات

(١١٧) اولاً امزج المذوب تحت الفحص بقدره من حامض كبريتيك قوي واتركه ليبرد ثم اضف اليه بلطافة مذوب الكبريتات الحديدوس القوي بنوع لا يمتزج فيه السائلان فعند ملتقاهما يتولد لون ارجواني او احمر يتحول الى اسمر ثم امزج السائلين فيبقى سبال ارجواني مسمر يذوب لونه عند احائه. هذا بشرط وجود النترات وقد يوجد في الحامض الكبريتيك قليل من الحامض النيريك او الهيبونيريك فيقتضي اذ ذاك معرفة وجودها او عدم وجودها لسبب لا يخفى

ثانياً اذا اُحمر نترات ما مع الحامض الكبريتيك الثقيل وقطع النحاس يتولد الاكسيد النيريك (ن ا) الذي يكتسب

أكسجيناً من الهواء ويتحول الى اعلى أكسيد النيتريك الذي يُعرف
بلون بخاره الاحمر الخوصي

الكاشف للكلورات

(١٠٨) اضع الى مذوب كلورات ما نقطاً قليلة من مذوب
النيل في حامض كبريتيك ثم صب عليه مذوب الحامض
الكبريتوس او الكبريتيت الصوديك فيذهب اللون حالاً وذلك
لان الحامض الكبريتوس ياخذ الاكسجين من الحامض الكلوريك
والكلور المنفرد بزيل اللون ويمتاز الحامض الكلوريك عن
الحامض النيتريك بهذا الكاشف لان اللون يبقى غير متغير اذا
كان في السيل حامض نيتريك عوضاً عن حامض كلوريك
ثانياً اذا غطسنا مادة يُظن انها تحتوي على الكلورات في
ضعفها او ثلاثة اضعافها من حامض كبريتيك قوي واحمينا المزيج
باعناء يصير السيل اصفر غامقاً اذا وجد كلورات فيه ويتولد
غاز اصفر مخضر حريف هو (كل ا_٢) يتفرقع تفرقعاً شديداً بجمارة
قليلة او عند ملامسته لقطعة جوخ مغطسة بزيت التريبتين .
ولا تخلو هذه العملية من خطر فيجب الانتباه حين مباشرتها فيجول

الكلورات الى الكلوريد بواسطة احراقه ثم يكشف عن الكلوريد
كما ذكر في بند ١١٤

الكاشف للخلات


(١١٩) اذا احمينا خلّات قليلاً مع حامض كبريتيك قوي
يتولد حامض خليك هيدراتي يعرف برائحته. واذا احمينا الخلات
مع الكحول وحامض كبريتيك بكميات متعادلة يتولد اثير خليك
ذو رائحة مقبولة خصوصية. ولا يسود الخلات بحامض كبريتيك
قوي حام. واذا اضفنا بعض نقط مذوب الكلوريد الحديدية
لمذوب الخلات المتعادل يصير السيل احمر غامقاً من
تولد الخلات الحديدية واذا زادت الخلات
يتولد راسب على هيئة قطع صفراء
عند غليانه فيعدم السيل
اللون بعد
قليل

القسم الثالث

في الفحص بالحرارة

الفصل الاول

في ماهية اللهب والبورى الخ



ماهية اللهب


(١٢٠) لا بد لتوليد اللهب من ان تكون المادة المشتعلة ما يتحول الى غاز بجمرة او طأ ما يلزم لاتحاده مع الاكسجين . فالنجم اي الكربون لا يولد لهيباً اذا اشتعل لان الكربون يتحد مع الاكسجين وهو جامد وكذلك الحديد واما الكبريت فيتحول الى غاز قبل اشتعاله ثم يتحد مع الاكسجين فيولد لهيباً . فاللهيب اذا يتولد من اتحاد غاز مع الاكسجين على حرارة كافية فهو غلاف نير فاصل بين المادة المشتعلة من الداخل والاكسجين من الخارج والنسبة بين النور والحرارة في لهيب مختلفة لان الحرارة تتوقف على شدة الفعل الكيبي فالهيدروجين مثلاً من الغازات يولد حرارة شديدة ونوراً ضعيفاً لعدم وجود جامد في اللهب . واما النور فيتوقف على وجود الجامد حامياً داخل اللهب فاذا وضعت قطعة كلس مثلاً في لهيب الهيدروجين نحى وتنير نوراً ساطعاً ولذلك اذا كانت المادة المشتعلة مركبة من هيدروجين وكربون كالشمع او الزيت تولد حرارة ونوراً من الهيدروجين والكربون اللذين فيها ويتحقق وجود مادة جامدة في لهيب الشمع او الزيت من انه اذا وضعنا صحناً صينياً بارداً فيه او قربناه الى حائط تبرد المادة الجامدة فيه وهي

الكربون وتجمع على الصحن او الحائط

في كل هيب اربعة اجزاء وهي الجزء المظلم ط شكل ١٠ والجزء
الازرق في الاسفل (زر) والجزء النير في الاعلى (اص س)

والجزء الرابع وهو يحيط بالجزء الثالث (ادس)

شكل ١٠



اما الجزء المظلم فهو المواد الغازية التي
تتصعد في الفتيلة من المادة المحترقة واما

الازرق فهو ما ينتج عن اتحاد تامر بين بعض
تلك الغازات واكسجين الهواء. واما النير فهو

المواد الجامدة الصاعدة من الجزء المظلم محمجة
الى درجة الانارة بجمارة الجزء الازرق واما

الجزء الرابع فهو غير منظور في الغالب ويحيط
بالجزء النير ويحصل من اتحاد مواد الجزء النير

اتحاداً تاماً باكسجين الهواء. ومواد الجزء المظلم
متوقفة على المادة المحترقة فاذا كان في المادة

المحترقة هيدروجين وكربون فمواد الجزء المظلم هي كذلك او
هيدروجين فقط فاهيدروجين

(١٢١) ثم اذا وضع معدن حينئذ تكون الحرارة شديدة اي عند

راس الهيب في الجزء الرابع يتأكسد اذا كان مما يقبل التاكسد عند

احمائه في الهوام ويُسمى اللهب المشار اليه اللهب الخارجي او الموكسد
 واذا وُضع أكسيد معدن ما داخل اللهب اي حيث يكون
 الكربون حامياً وشديد الالفة للاكسجين يفقد اكسجينه ويبقى المعدن
 ويُسمى هذا اللهب اللهب الداخلي او المحلل فاللهب اذا يتم فعلين
 كيمييين متناقضين وهما التركيب والتحليل


واعلم ان اكسجين الهوام لا يدخل الى وسط الجزء الاصفر بل
 يلامسه من الخارج فقط فاذا ادخل الاكسجين الى وسطه بواسطة
 ما تزداد الحرارة فتزيد قوة اللهب الخارجي على التركيب واللهب
 الداخلي على التحليل ويستعمل لذلك البوري

البوري

(١٢٢) وهو آلة بسيطة التركيب وقد استعملها الصاغة منذ
 زمان طويل ولم يزالوا يستعملونها في اتمام الاعمال التي يلزم لها حرارة
 شديدة وقد شاع استعمالها بين الكيميين الآن حتى لم يعد يُستغنى
 عنها عندهم فانهم يكشفون بها عن وجود المعادن والعناصر التي
 تتركب منها بعض المواد او عن عدم وجودها وبها يتمون الفعلين
 الكيميين المذكورين انفاً وهو انواع منها البوري الاعتيادي وهو

انبوبة نحاس معكوفة تنتهي بثقب دقيق كما ترى (١) في شكل ١١


شكل ١١



وبه يتم أكثر العمليات غير أنه إذا نُفخ فيه مدة طويلة يتكاثف بخار النفس على جدار الداخلية فيندفع إلى الليبي فيعيق العمل ولذلك يوسعونه من أسفله ليتجمع البخار فيه كما ترى عند ب و ت

شكل ١٢

شكل ١١



الليبي المؤكسد

(١٣٢) ونزاهة شكل ١٢ ويتولد بوضع فوهة البوريه داخل


الذهب لاجل ادخال الاكسجين اليه ثم ينفخ في البوري نفخاً متواصلاً
فيكبر الجزء الازرق حتى يكاد يكون وحده الذهب من جرى كمال
اتحاد المادة المشتعلة مع الاكسجين وذلك ظاهر في الشكل ويحيط
بالجزء الاعلى غلاف غير منظور تقريباً طرفه شديد الحرارة فاذا
وُضع معدن تجاهه بواسطة ما كشرط الپلاتين وجعلت بعد
المعدن عن الجزء الازرق بقدر الاقتضاء كما ترى في الشكل ١٢
يتأكسد واذا جعلته يمس طرف الجزء الازرق من الخارج يحى فقط

الذهب المحلل

(١٢٤) تراه شكل ١٢ ويتولد بوضع فوهة البوري خارج

الذهب لاتحاد مواد الجزء الخارجى منه بالاكسجين وينفخ في البوري

شكل ١٢



نفخاً متواصلاً فتزداد الحرارة

وبذلك يحى الكربون

داخل الذهب فتزيد

الفتنة للاكسجين. ثم اذا

وُضع أكسيد معدن

داخل الذهب كما في

الشكل يفقد أكسجينه ويبقى المعدن

النفخ

(١٢٥) قد يُجناح الى ادامة مجرمة الهواء عدة دقائق فاذا أُريد اتمام ذلك بالبوري لزم ان يتواصل النفس حتى يسد مسد المجرمة المذكور، ويقضى لذلك ممارسة وطريقة تعليمه عسرة واما اتمامه فسهل غير انه اذا كان النفخ قوياً يتعب صاحبه على غير طائل فالافضل ان يكون معتدلاً لا يزيد عن التنفس الاعيادي الا قليلاً في الشدة وذلك كله حسب مقتضى الحال
 حاشية. يجوز استعمال اي ضوء شئت كالشمع والزيت والكحول غير ان الزيت يُفضل على غيره.

في الماسكات

(١٢٦) ان المواد التي تمسك بها المادة المعرضة على اللهب كثيرة كالپلاتين والفضة والزجاج حسب مقتضى الحال

في الفحم

(١٢٧) ان الامور التي تفضل استعمال الفحم في اعمال البوري هي اولاً انه لا يبصر ثانياً انه لا يصلح لنقل حرارة المادة المطلوب احماؤها فتسخن عليه قبل غيره من الماسكات ثالثاً انه ذو مسام

فتنفذ فيه المواد القابلة الصهر كالبورق والصودا ويبقى عليه ما لا يقبل الصهر رابعاً انه متى أُحْيى تزيد الفتنة للاكسجين فيعين في تحليل الاكاسيد بواسطة اللهب الداخلي وهو يُستعمل بالاكتر في تحليل الاكاسيد المعدنية او امتحان قبول المواد للصهر ويلزم ان يكون صامداً محروقاً جيداً لا يخرج شراراً ولا يشعل باللهيب ولا يدخن وعلى كل حال لا بد ان يكون جافاً تماماً. ويقطع على زوايا قائمة للخطوط العمودية التي فيه والسطح الحاصل هو الذي يستعمل واذا كانت الفحمة جيدة واستعمل سطحها يُبرّد ويستعمل منها السطح الذي نمثه

في الپلاتين

(١٢٨) يُستعمل الپلاتين في كل اعمال التاكسد على شكل شريط او ورق توضع المادة المطلوب تاكسدها على سطحه ويستعمل ايضاً في اصهار المواد بالكربونات الصوديك او البورق او غير ذلك بقصد ملاحظة الظواهر التي تحدث في مجرى الاصهار وتعيين اللون الذي يكتسبه الورق او غيره. ويستعمل ايضاً في ادخال المادة الى لهيب الفنديل

الفصل الثاني

في احماء المادة وحدها

العمل الاول

(١٢٩) خذ قطعة صغيرة من السكر وضعها في انبوبة ناشفة

نظيفة مسدودة من احد طرفيها

احم الانبوبة شيئاً فشيئاً فيحصل النتائج الآتية

اولاً تسود المادة

ثانياً تنصعد عنها البخرة ذات رائحة خصوصية

ثالثاً تنكاثف هذه البخرة فتحول الى نقط كالصخر وتجمع

كنقط على الجدران الباردة من الانبوبة

العمل الثاني

خذ قطعة ورق او ريش واحمها كما في العمل الاول

فتسود المادة

وتنصعد عنها البخرة ذات رائحة خصوصية

وتتكاثف وتجمع على جدران الانبوبة على هيئة نقط الماء
ومادة كالمحمر

فهذه النتائج جميعها تدل على وجود مادة آليّة

العمل الثالث

ضع قليلاً من ملح من املاح الامونيوم في انبوبة واحمها
فيتحول الامونيوم الى بخار ابيض يتكاثف في اعلى الانبوبة على
هيئة نقط ماء ومادة بيضاء

امزج قليلاً من الملح مع مقدار من الكلس الكاوي ونقطة ماء
او مع صودا كاوي واحم المزيج فتنفوخ رائحة النشادر

العمل الرابع

ضع بلورة صغيرة من الكلورات البوتاسيك (كلورات لبوتاسيوم)
في انبوبة واحمها شيئاً فشيئاً الى اعلى درجة من الحرارة فيذوب
ثم اذا وضعت قطعة فحم في الانبوبة مع ملح تمحرق احتراقاً
شديداً. فهذه النتائج تدل على وجود كلورات (اونترات)

قد علمت من الاعمال السابقة ان الفحص بواسطة الحرارة
يعلنا بوجود او عدم وجود مادة آليّة في مادة نُطرح امامنا للتحليل

وذلك مهم كما سترى او بعلمنا شيئاً آخر عن تركيب المادة فلذلك
نشرع في الفحص عن مادة مجهولة باستخدام الحرارة كما سترى في
القسم الرابع من هذا الكتاب

واذ قد اتضح ذلك لك تتقدم الى الفحص بالحرارة
(١٢٠) الفحص بالحرارة اما ان يكون باحماء المادة وحدها
وهو الفحص البسيط او باحماؤها مع مادة اخرى وهو الفحص المنقي
والاول على ثلاثة انواع. اولاً احماء المادة وحدها في الانبوبة
المسدودة الطرف. وثانياً احماؤها وحدها على قطعة فخر. وثالثاً
احماؤها وحدها على شريط پلاتين لكشف تلويثها اللهب

احماء المادة في الانبوبة المسدودة الطرف

(١٢١) لكي تعرض المادة للحرارة استحضرن انبوبة زجاجية ناشفة
نظيفة طولها نحو ثلاثة قراريط (والقصد بذلك امكان الوصول
الى البخار الصاعد للكشف عنه بورق اللتوس) مسدودة من احد
طرفيها وامسحها من داخل لكي نتجمع عليها المادة المتصعدة. ضع
في هذه الانبوبة قليلاً من المادة تحت الفحص. احم المادة الموضوعة
في الانبوبة شيئاً فشيئاً الى اعلى درجات الحرارة فيحصل لنا نتائج
مختلفة نذكر اشهرها

في ما يسودُّ

(١٢٢) تسودُّ المادة وتنصعد عنها غازات او انجزة ذات رائحة غير مقبولة على الغالب كالرائحة الناتجة عن احتراق الريش او الورق وقد تتكاثف هذه الانجزة فتتحول الى نقط كالحُمر وتتجمع ايضاً على هيئة الماء على جدران الانبوبة . فهذه النتائج جميعها تدل على وجود مادة آليّة غير ان مجرد الاسوداد لا يدل على وجود مواد آليّة انظر بند ١٢٤

في ما لا يسودُّ

(١٢٣) لا تسودُّ المادّة بل او لا تنصعد عنها غازات او انجزة وهي
 (ا) بخار مائي الذي يتكاثف في اعلى الانبوبة . اكشف عنه بورق اللتموس فان كان قلوباً فالمظنون وجود الامونيا فيه وان كان حامضاً فالمظنون وجود حامض كبريتيك او حامض هيدروكلوريك او حامض نيتريك او حامض هيدروبروميك او حامض هيدروبوديك فيه

(ب) اكسجين ويكشف عنه باشعاله الكبريت المطفي وهذا الغاز يدل على وجود نترات او كلورات او اكاسيد عالية فاذا ذابت المادة التي يتصعد عنها اكسجين وحرقت قطعة فحم توضع

- فيها يدل به على وجود نترات او كلورات فيها
 (ت) حامض تحت نيتريك يُعرف بلون بخاره الاحمر المسمّر
 وينتج من انحلال النترات
 (ث) حامض كبريتوس يُعرف برائحته وينتج من انحلال
 الكبريتات والكبريتيد والكبريتيت
 (ج) حامض كربونيك يُعرف بفعله في ماء الكلس (انظر
 بند ١٠٠) وينتج من انحلال الكربونات
 (ح) سيانوجين يُعرف برائحته الحريفة كرائحة اللوز المر
 (خ) هيدروجين مكبرت يُعرف برائحته وينتج من انحلال
 الكبريتيد المرطب
 (د) امونيا يُعرف برائحته
 ثانياً تجمع مادة في اعلى الانبوبة
 (ا) كبريت على هيئة نقط حمراء تصفر حينما تبرد
 (ب) املاح الامونيوم على هيئة مادة بيضاء يكشف عنها
 باخذ قطعة صغيرة من المادة تحت الفحص ومزجها بقليل من
 الكلس الراوي واحماء المزيج فان وجد امونيا يُعرف برائحته وبالبخار
 الابيض الناتج عن وضع قضيب زجاج في الانبوبة يكون قد
 غطس في حامض هيدروكلوريك مخفف. فان تآثرت المادة

تحت الفحص بالحرارة فلا بد اذ ذاك من الكشف عن الامونيوم

(ت) زبيق على هيئة نقط معدنية

والكبريتيد الزبيقوس على هيئة مادة سوداء

والكلوريد الزبيقوس والكلوريد الزبيقيك فيتجمعان على

هيئة مادة بيضاء

ويتجمع اليوديد الزبيقيك (اليوديد الاحمر) على هيئة مادة صفراء

(ث) زرنج ومركبائه يتجمع على هيئة مادة سوداء لامعة وتفوح

رائحة الثوم

اما الحامض الزرنيخوس فيتجمع على هيئة مادة بيضاء بلورية

تحت الميكروسكوب

ويتجمع الكبريتت على هيئة مادة حمراء سمراء وهي حامية وصفراء

حمراء او مائلة للاحمر فقط وهي باردة وما يتجمع من الكبريتيد يشبه

ما يجمع من الكبريتت الصفر تقريباً

(ج) الاكسيد الاتيمونوس (اكسيد الاتيمون الثالث)

بذوب اولاً على هيئة سائل اصفر ثم يتجمع على هيئة مادة بيضاء

مركبة من بلورات ابرية

(ح) حامض اكساليك يتجمع على هيئة مادة بيضاء بلورية

مع البخر كثيفة

نظير افادة الفحص

احم المادة في انبوبة زجاجية

		تسود
وتتصعد عنها	ولا تتصعد عنها	تذوب مولدة سائلا اصفر ثم تتصعد
النجرة او غازات	النجرة فاللادة ملح	تتصعد وتجمع على جدران ذات
ذات رائحة	من املاح النكل	الانبوبة كمادة بيضاء (انت) خصوصه
خصوصية فيها	او الكوبلت او	(او سائل لالون لثم على
مادة آلية	الحديد (اما	تتصعد وتجمع كمادة بيضاء الانبوبة
	الحديد فيجمر	(زبي كل) او (رص كل) الزرنج
	عند تبريده	او تذوب وتتحرق قطعة فحم الكبريت
		توضع فيها ولا تتصعد عنها الامونيل
		مادة جامدة النترات
		والكلورات

ناشفة الى اعلى درجات الحرارة

لا تسود

انجرة	تتصعد انجرة	تتصعد انجرة او	تتغير	تبقى على
رائحة	عديمة الرائحة	غازات ذات	عنها غاز	لونها ما كانت
تتجمع	تتجمع على جدران	رائحة ولا تتجمع	لا لون له	بند عليه
ن	الانبوبة	على جدران	ولا رائحة	١٣٤
	زيق	الانبوبة	ولا يتغير	
(ض)	كبريتيد أسود	الهيدروجين	لون المادة	
(صفرا)	يوديد احمر	المكبرت من	الكربونات	
(ض)	كلوريد اصفر	الكبريتيد		
	وهو حامٍ ولا لون	المرطب		
	له بعد تبريده	والكبريتات		
	حامض اكساليك	الحامض		
	كمادة بيضاء مع	الهيونيتريك من		
	انجرة كثيفة	النترات		

تغيير لون المادة

(١٣٤) تُعرف بعض المواد بتغيير لونها عند احماها في الانبوبة

المسدودة الطرف

المادة	لونها بعد تبريدها	لونها حامية	لونها الاصلي
الأكسيد النضديريك	اصفر	اسمر	ايض او ايض مصفر
املاح التوتيا	ايض	اصفر	ايض
املاح الرصاص	اصفر	اصفر	ايض
املاح النحاس	اسود	اسود	ازرق او اخضر
املاح الزموث	اصفر فاتح	اصفر غامق	ايض
املاح الكدميوم	اسمر	اسمر	ايض
الكرومات	اللون الاصلي اذا كانت قد احميت قليلا واخضر اذا كانت قد احميت كثيراً	اصفر غامق او احمر غامق	اصفر او احمر
أكسيد الحديدوس	احمر	اسود	احمر

احماء المادة على الفحم

(١٢٥) يوضع قليل من المادة في فحمة مجوفة ويحمى باللهيب الخارجي وحذراً من تفرغ المادة تُسحق ونُحى بلطافة ثم تحمى كما اشرنا وقد يستعمل البورق في مثل هذه الاعمال وذلك بان تحمى المادة على شريط بلايتين او ملفظ ثم تمس البورق فيذوب ويلصق بها ثم توضع على الفحم ونحى كما سبق فترى النتائج الآتية
اولاً يفيج رائحة وينبغي ملاحظة ذلك بعد احماء المادة على الفحم وذلك وان كان يظهر في الانبوبة المسدودة الطرف غيرائه يظهر هنا باكثر سهولة

(١) رائحة الكبريت من احماء الكبريت او الكبريتيد واحسن ما تظهر باللهيب المؤكسد
(ب) رائحة الثوم. من الزرنج ومركباته فان كان الزرنج قليلاً يعرف بعد احماؤه بقليل في اللهب الداخلي
ثانياً تذوب وتحدث شراراً بعد احماؤها قليلاً على الفحمة وذلك يدل على نيترات او كلورات. وهذا من اشهر ما يلاحظ في استعمال الكاشف المذكور

تلوين لهيب القنديل

(١٢٦) تُعرف مواد كثيرة بتلوينها باللهيب. فاذا كانت المادة

لا لتفرغ تُمسك بملقط والاحسن ان تحمي شريطة پلاتين ثم تمس
المادة او تبل الشريط وتمس مسحوق المادة ثم تحمي في راس الجزء
الازرق ويلاحظ اللون في الجزء الخارجي. ويجب كل الاعثناء في
تنظيف الپلاتين تماما ويعرف ذلك من وضعها في اللهب يُرى
اذا كانت تلوّنه ويجب ان يكون اللهب ايضا عديم اللون

اللون الاصفر الصوديوم ومركبائه

اللون البنفسجي الپوتاسيوم ومركبائه

الاحمر السنرونتيوم ومركبائه

احمر مصفر الككسيوم ومركبائه

اخضر نحاس ومركبائه

اخضر مصفر الباريوم ومركبائه والبورات والزنك المعدني

اخضر مزرق الفصفا

ازرق الانتيوم والزرنيخ ومركبائهما

فان كانت المادة وحدها لا تلوّن اللهب او تلوّنه قليلا وظن

بوجود فصفا او بورا فيها في حامض كبريتيك ثم احما

فيزيد اللون او ظن بوجود باريوم او سنرونتيوم او نحاس فيها في

حامض هيدروكلوريك ثم احما فيزداد اللون ايضا

الفصل الثالث

في احماء المادة مع مادة اخرى

الفحص المنقي

(١٣٧) امزج قليلاً من مسحوق مركبة معدنية قدر ما يعادل حبة سمس مع كمية متساوية من الكربونات الصوديك واجبلها بقليل من الماء على هيئة كتلة صغيرة. خذ قطعة من الفحم الاعنيادي الجيد الناشف واقطعها قطعاً مستعرضاً حتى يكون سطحها المستعمل على زاوية قائمة للخطوط المستطيلة فهذا السطح هو المستعمل ابدأ في الفحص . احفر في سطح الفحمة ثقباً صغيراً بقدر ما يسع نصف حبة حمص وضع فيه القلي المعد المذكور انفاً. واعرضه مدة بضع دقائق على هيب البوري الداخلي بحيث تكون المادة على الفحم مغطاة بالهيب

(١٣٨) اما الغايتان اللتان يستلزمان الانتباه في هذا الفحص فهما ما يبقى في اسفل الثقب وما يجمع على جوانبه . ثم اذا تولدت

كروية ارفعها بملقط وضعها على سندان او صفيحة حديد وطرقها بلطافة فان انطرت ولم تنكسر فهي قابلة التطرق والأفغير قابلة التطرق فالمعادن الآتية تبقى في الثقب على هيئة نقطة او كروية معدنية

(١) ذهب على هيئة كروية صفراء قابلة التطرق ولا يجمع منه شي على جوانب الثقب

(ب) نحاس على هيئة كروية حمراء قابلة التطرق ولا يجمع منه شي على جوانب الثقب

(ت) قصدير على هيئة كروية بيضاء لامعة قابلة التطرق ويجمع منه على جوانب الثقب حول الكروية مادة صفراء وهي سخنة وبيضاء بعدما تبرد

(ث) رصاص على هيئة كروية تصهر بسهولة قابلة التطرق ويجمع منه على جوانب الثقب مادة صفراء

(ج) فضة على هيئة كروية بيضاء لامعة قابلة التطرق ولا يجمع منه شي على جوانب الثقب

(ح) بزموث على هيئة كروية بيضاء غير قابلة التطرق ويجمع على جوانب الثقب مادة صفراء كما في الرصاص

(خ) انتيون على هيئة كروية بيضاء غير قابلة التطرق ولا

يجمع منه شيء على جوانب الثقب

قد يحدث ان هيب البوري يفعل في الفحم فينتج عن ذلك مادة رمادية نجمع على جوانب الثقب حول المادة تحت الفحص الأمان هذه المادة هي غير قابلة للتغير ولا الزيادة لدى عرضها على هيب البوري فعلى المحلل اذا ان يكشف عن الفحم قبل الشروع في الفحص حتى اذا حدث شيء من هذه يمنع الاتكال عليه . فان حصل بعد الفحص كرية يجب ان تخرج بملقط وتطرق لتعرف اذا كانت قابلة للتطرق فان كانت كذلك ردها الى موضع جديد في الفحم واحمها بلهب البوري المؤكسد فالذهب والفضة بصهران اذاك ولايتاكسدان وبذلك يمتازان عن المعادن الأخر التي تئاكسد . اما كرية القصدير فتصهر وتئاكسد ويجمع حولها مادة بيضاء هي ثاني أكسيد القصدير الذي لا يعود يصهر في هيب البوري المؤكسد او المحلل واما كرية الرصاص فتذوب بسهولة ويجمع حولها مادة صفراء تنطير بلون ازرق في هيب البوري واما كرية النحاس فتسود من تولد أكسيد النحاس ويخضر اللهب

(١٢٩) ان احما بعض المركبات مع صودا على فحم في اللهب الداخلي هو اسرع الطرق وادقها للكشف عن بعض المعادن التي

فيها فانه باحماء بعض المركبات وحده في الهيب المذكور تستخلص
 المعادن التي فيه غير ان معادن البعض الآخر لا تستخلص وحدها
 الا اذا احميت مع صودا. ثم ان كان المعدن قليلاً في المركب
 فكثيراً ما لا يرى لنفوذه في مسامات الفحم فيستخلص منها بان
 يبيل سطح الفحمه ثم بجفر ويوضع في هاون ويسحق ثم يصب عليه ماء
 وبهز بلطافة فيطفنوا الفحم على سطح الماء ويبقى المعدن راسباً ثم صب
 الماء عنه وافعل هكذا مراراً حتى تظهر لك قطع المعدن اللامعة
 وتعرف من ظواهرها او باحماؤها مع البورق كما سيذكر وكثيراً ما
 تعرف مما تجمع حول الثقب في الفحمه كما مر

(١٤٠) ان الذهب والفضة والرصاص تنقى بسهولة
 والقصدير والنحاس باقل سهولة من المعادن السابقة وقد يحدث
 فضلاً عما ذكرنا نتائج اخرى في الفحص المنقي منها تصعد الكبريت
 واملاح الامونيوم والكلوريد والبروميدي واليوديدي والكبريتيت
 كل من الصوديوم والپوتاسيوم وكلوريد كل من الرصاص
 والزنموث والقصدير والنحاس ومنها تصعد الزئبق المعدني
 والزرنيخ والانتيمون والزنك ومركباتها على هيئة انجزة تطير ثم تنزل
 على الفحم على بعد يختلف باختلاف قابليتها للظيران وهذه المجموعات
 التي تجمع هي بيضاء اللون غير انها بعدما تجمع على الفحم تتخذ لونا

رمادياً او ازرق ما عدا الكبريت وعند تصعد الزرنيخ تفوح رائحة خصوصية وتجمع المادة المتصعدة على بعد من الثقب. اما ما يجمع من الزنك فاصفر وهو حامٍ يبيض في حالة البرودة ويجمع بالقرب من الثقب ويصهر بصعوبة ويعرف حضور النترات والكلورات غالباً بانهما يشتعلان ملتهبين

ويجب ملاحظة ثلاث امور مهمة في احماء المادة مع صودا وهي اولاً عرضها على اللهب الداخلي مدة كافية وثانياً الانتباه الى حفر الفحمه وكب الماء عن المعدن حتى لا يفقد شيء من المعدن وثالثاً فحص المعدن الباقي على اشكاله ويفحص اذا امكن بعدسية ومغنيط وبورق

في احماء المادة مع البورق

(١٤١) ويتم ذلك عادة على شريط پلاتين وذلك بان يعكف طرف الشريطة وينظف ثم يحمى الى درجة الحمرة ويغمس في مسحوق البورق فيحمى ما يلتصق حتى يصهر ويصير مثل زجاجة صافية عديمة اللون حينئذ يوثى به حتى يلامس المادة تحت الفحص ثم يحمى مع ما التصق منها في اللهب الموكسد ويلاحظ اذا كانت المادة تذوب حالاً او رويداً واذا ذابت بفوران او بلا فوران وبعد

ذوبانها انظر في كرية البورق الشبيهة بالزجاج لتعرف لونها وهي
 حامية وبعدها تبرد ولكن لا تنظرها بضوء السراج لئلا يلتبس
 اللون عليك وقد يتفق ان كثيراً من المادة يلتصق بالبورق فيجعل
 لونها شديداً حتى تعسر معرفته فاكسر الكرية حينئذٍ وخذ قسماً
 منها واغمسه في البورق ثم احمه فترى اللون واضحاً او كرر العمل
 حتى يتضح لك فترى ما تقدم ان شدة اللون تختلف باختلاف
 كمية المادة والبورق فاستعمالها يكون على مقتضى الحال وتبهر
 اللون واستعمال المادة والبورق يقتضي لها انتباه وصناعة الى التمام
 وبعد احماء المادة والبورق في اللهب المؤكسد كما مرّ بمجربان
 في اللهب الداخلي بانتباه حذرٍ ان يتجمع السناج
 عليها ثم يلاحظ لون البورق وهو حامٍ
 وبعدها يبرد كما

تقدم

(١٤٢) وتظهر افادة احماء المادة مع البورق من هذا الجدول

احم المادة في اللهب الداخلي		احم المادة في اللهب الخارجي		اسم المادة
لون الكرية الباردة	لون الكرية الحامية	لون الكرية الباردة	لون الكرية الحامية	
رمادي اذا كانت قد اُجميت قليلاً	عدم اللون	عدم اللون	اصفر اذا كانت المادة كثيرة	الرصاص
"	"	"	"	الزيموث
"	"	"	"	الانتيمون
اخضر فاتح او غامق	اخضر فاتح او غامق	اخضر مصفر	اصفر اذا كانت المادة قليلة	الكروم
اخضر او اخضر فاتح	اخضر	اصفر	احمر او اسمر	الحديد
"	عدم اللون	اسمر او اسمر محمر	بنفسجي	النكل
عدم اللون	"	بنفسجي محمر	بنفسجي	المنغنيس
ازرق	ازرق	ازرق	ازرق	الكوبلت
احمر اذا كانت المادة كثيرة	ازرق	ازرق اذا كانت المادة كثيرة	اخضر	النحاس

القسم الرابع

في كيفية فحص مادة مجهولة

(١٤٣) أولاً يجب على المحلل في فحص مادة مجهولة ان يلاحظ خصائصها بقدر الامكان كاللون والرائحة اذا كانت سائلة واللون والرائحة والثلث النوعي وبنيتها البلورية وغير ذلك من الظواهر اذا كانت جامدة. وبعد الانتباه التام بالملاحظة ظواهر كل مادة وضعت للتحليل يسهل عليه معرفة المواد بمجرد النظر اليها وذلك من افضل الطرق واسرعها

ثانياً بما اننا نعيد فحص المادة المجهولة مراراً عديدة للوقوف على حقيقتها بالتاكيد فالاحسن ان لانفرط في استعمال المادة الاصلية لئلا نخسرها ودفعاً لذلك نوضع منها قطعة على حدة لاستعمالها عندما تمس الحاجة اليها

(١٤٤) المادة المجهولة اما ان تكون سائلة وفحصها الاستعدادي بند ١٧٩ او معدناً صرفاً وفحصها الاستعدادي بند ١٤٥ وما يتلوه واما ان لا تكون سائلاً ولا معدناً وفحصها الاستعدادي بند ١٤٩

الفصل الاول

في فحص المعادن الاستعدادي

(١٤٥) اذا كانت المادّة المجهولة معدناً صرفاً ضعها في قنينة صغيرة او انبوبة واضف اليها حامضاً نيتريكاً ثقيلاً واحمها فيجذت واحد من هذه الثلاثة وهي ذوبان تام او انفصال مادة بيضاء لا تقبل الذوبان او بقاءها على حالها ولتبحث عن كل واحد منها بالتفصيل

في ما يدوب في الحامض النيتريك

(١٤٦) اذا حدث ذوبان تام فلا بد من عدم حضور الذهب والبلاتين والقصدير والانتيمون لان الحامض النيتريك لا يؤثر في الذهب والبلاتين ويحوّل القصدير والانتيمون الى اكاسيد لا تدوب فيه. خفف المذوّب بماء بعد نزع اكثر الحامض بالتجفيف واذا تكدر المذوّب عند اضافة ماء اليه لتخفيفه يدل على حضور

الزموث فيه (بند ٢٦) فان كان الزبيق حاضراً فعلى هيئة ملح زبيقك. ثم افحص المذوب على الكيفية القانونية المذكورة (بند ١٨٢ وما يليه)

في ما انفصل

(١٤٧) اذا انفصلت مادة بيضاء لا تقبل الذوبان دلت على وجود القصدير او الاتيمون او كليهما . خفف السيل بالماء بعد نزع أكثر الحامض بالتجفيف ثم فرّق الراسب بالترشيح وتصرف بالمرشح على الكيفية القانونية (بند ١٨٢) وبعد غسل الراسب جيداً بالماء ضعته في مذوب مثقل حام من الحامض الطرطريك فان ذاب كله كان القصدير غائباً ثم يتحقق حضور الاتيمون اذا ولد الهيدروجين المكبرت راسباً احمر برتقالياً في مذوب الحامض الطرطريك وان لم يذب كله في الحامض الطرطريك يرشح المذوب ويفحص في المرشح عن الاتيمون بحسب الطريقة المذكورة انفاً وفي الراسب عن القصدير بالبوري وجه ١٥٩ - ١٦٠ ات

في ما لا يذوب في الحامض النيتريك

(١٤٨) اذا بقي راسب معدني غير متغير بالحامض دل على

الذهب والپلاتين . خفف المذوب بماء بعد نزع أكثر الحامض
 بالتجفيف ورشح وافحص المرشح حسب الطريقة بند ١٨٣ وما يتلوهُ
 ذوب الراسب المعدني في ماء الذهب واقسمهُ الى قسمين وافحص
 في قسم منه عن الذهب حسب ما مرّ (بند ٤٨ على
 وجه ٧٣) وفي الآخر عن الپلاتين حسب ما
 مر ايضاً (بند ٤٩ على
 وجه ٧٤)

الفصل الثاني

في فحص الجوامد الاستعلادي

(١٤٩) ثم لا بد من فحص الجلمد بالفحص البسيط سواء كان معدناً ام لا مع الانتباه الكمال لتحقق وجود مادة آية وامونيوم او عدم وجودها

(١٥٠) ان الفحص البسيط يحنوي على علمتين اولاهما فحص الانبوبة المسدودة الطرف والثانية الفحص المنفي

في فحص الانبوبة المسدودة الطرف

(١٥١) لكي تعرض المادة على الحرارة استحضرنبوبة زجاجية ناشفة نظيفة طولها نحو ثلاثة فراريط مسدودة من احد طرفيها حسب ما مرّ وجه ١٥٠

وضع في هذه الانبوبة قليلاً من المادة المسحوقة . واحمها شيئاً فشيئاً بلهب القنديل ثم بالبورى الى اعلى درجات الحرارة فاما ان تسودّ اولاً . واذا اسودت فاما ان تتصعد عنها رائحة خصوصية اولاً (١٥٢) فاذا اسودت وتصدت عنها البخيرة لها رائحة الريش

المحروق وتحوّلت الى نطف كالصبر ونجمت على جدران الانبوبة
دل ذلك على وجود مادة آلبه في المادة تحت الفحص

(١٠٩٣). واذا لم تسود او اذا اسودت ولم تصعد عنها البخرة
ذات رائحة فكل ما يتعلق بها حينئذٍ مذكور في جدول على وجه
١٥٢ وما يجب الالتفات اليه في هذا الفحص هو تحقق وجود
الامونيوم او عدم وجوده. فاذا كانت الحرارة تؤثر في المادة او كان
المبتدي غير متيقن تأثيرها فيها فالاحسن انه يكشف عن الامونيوم
والمادة في الانبوبة

(١٥٤) يضيف نقطتين من صودا كاواو قليلاً من الكلس
ونقطتين من الماء ويحى المزيج فاذا كان الامونيوم حاضراً يعرف
برائحة النشادر المتولد او بان يغس فضيف من زجاج في حامض
هيدروكلوريك مخفف ثم يدخل الى الانبوبة فيتولد بخار ابيض
كثيف اذا كان فيها امونيوم

في ازالة المادة الآلية

(١٠٥٥). انه لا يمكن الكشف عن بعض المواد غير الآلية الا
بعد ازالة الآلية منها لذلك اذا وجدت مادة آلبه بفحص الانبوبة
للسدودة الطرف يجب على المحلل ان يزيلها وذلك بانه تؤخذ

قطعة من مادة تحت الفحص كافية للكشف عن الموجود فيها ونحرق في بوظقة صينية مكشوفة للهواء حتى يحرق كل الكربون او على صفيحة بلايتين ان لم يوجد في المادة معدن يصهر بسهولة كالفضة والرصاص والاحسن احراق المادة شيئاً فشيئاً لادفعة واحدة اما بعض المواد القابلة الطيران فتفقد في استعمال هذه الطريقة وبعضها كالالومينا والاكسيد الحديدك والاكسيد الكروميك تصير غير قابلة الذوبان فاذا اريد التدقيق الكلي يستعمل لذلك طريقة اخرى خالية عن هذه الاضرار وهي ان توضع المادة في صحن صيني ويضاف اليها حامض هيدروكلوريك ثقيل صرف مساوياً في الوزن للجامد الجاف المحاضر

يجي الصحن بلطافة على حمام مائي ويضاف اليه من حين الى حين قطع صغيرة من الكلورات البوتاسيك الصرف ويحرك ما فيه على الدوام. وتبقى اضافة الكلورات البوتاسيك حتى يصير المزيج سائلاً تماماً ولونه اصفر فاتح ثم يضاف اليه ٢٠ او ٣٠ قحمة ايضاً من الكلورات البوتاسيك ويجي حتى لا يعود يفيض رائحة الكلور ثم يرشح ويغسل الباقي جيداً ثم يجفف ماء الغسل على حمام مائي ويضاف الى المرشح. والفحص المرشح بموجب بند ١٥٦ والفحص في الراسب عن الكلوريد الفضيك والكبريتات الرصاصيك

والأكسيد القصدير كما في بند ١٦٠ وما يتلوهُ

(١٥٦) ويوضع السائل المرشح في قنينة كبيرة ويبقى على درجة من الحرارة بين ٦٠° و ٧٠° س وينفذ الهيدروجين المكبرت فيه مدة ١٢ ساعة ثم يُترك ليبرد مع بقاء انفاذهم ك فيه ثم يغطى بقرطاس ويوضع في مكان معتدل الحرارة مدة ٢٤ ساعة فاذا افاج رائحةهم ك ضعيفة (في اخر هذه المدة) يعاد امراره فيه بكثرة ثم يترك حتى تكاد الرائحة لا تشم فيه ثم يجمع الراسب على مرشحة ويغسل حتى يخلو الغسول من الكلور. ثم يفحص المرشح كما في بند ١٩٢

(١٥٧) اما الراسب فيجنوي على مادة آليّة وكبريت عداما فيه من المعادن فاذا لم يقصد في التحليل ان يفحص عن المعادن السامة يفحص الراسب على الكيفية المعتادة بند ١٦٠ والأفعلي هذه الكيفية. انتع الراسب مدة في ماء النشادر فيذوب منه الكبريتيد الزرنيخوس وتبقى الكبريتيدات الأخر غير ذائبة. رشح وجفف المرشح مع ماء الغسل على حمام مائي فيبقى الكبريتيد الزرنيخوس وهو اسمر اللون في الغالب من حضور المادة الآليّة التي يكون ماء النشادر قد اذابها. ثم ذوبه وافحصه حسب الطريقة المذكورة بند ١٩٠

(١٥٨) وبعد غسل الراسب الذي لا يقبل للتذويب في ماء النشادر غسلًا جيدًا أغلِه في حامض هيدروكلوريك ثقيل فيذوب ثم افحصه عن الاتيمون كما تقدم بند ٤١ وبند ٤٢

الفحص المنقي

(١٥٩) وبعد احماء المادة في الانبوبة المسدودة الطرف كما تقدم يجب احماؤها مع الكربونات الصوديك على قطعة لحم بموجب الفحص المنقي وجه ١٥٩ - ١٦٢

ويجب ملاحظة ثلاثة امور مهمة في احماء المادة مع صودا وهي اولاً عرضها على اللهب الداخلي مدة كافية وثانياً الانتباه الى حفر الفحمه وكب الماء عن المعدن حتى لا يفقد شي من المعدن وثالثاً فحص المعدن الباقي على اشكاله وفحص اذا امكن بعدسية ومغنيط وبورق

اما اهم غاية هذا الفحص هي التوصل الى معرفة وجود الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير والبرموت والاتيمون لانه اذا تحققنا وجود الفضة مثلاً علينا ان نستعمل الحامض الهيدروكلوريك لتذويبها لتلا يتولد الكلوريد الفضيك غير قابلة الذوبان بل تستعمل الحامض

النيتريك لذلك

الفصل الثالث

في اعداد مادة جامدة للفحص عنها

(١٦٠) قد قلنا ان المادة المجهولة اما ان تكون سائلا او معدنا
 او لا تكون ذلك واذا كانت المادة سائلا يجب ان تفحص فيها
 حسب ما ياتي بند ١٧٩ واذا كانت معدنا فقد تقدم الكلام في
 كيفية تحويلها الى سائل بند ٤٥ الى بند ١٤٨ واذا لم تكن سائلا
 ولا معدنا تحول الى سائل بعد الفحص بالحرارة الذبي قد فرغنا
 منه وذلك كما ترى

(١٦١) وبما انه لا يوجد مذوب عمومي يضح على جميع المواد فلذلك
 تستعمل للتذويب مذوبات متعددة اما عدد المذوبات المستعملة
 في التحليل الكيفي المختصة بالاملاح والمواد المعدنية وغير المعدنية
 فهي اربعة الماء المستنظر والحمض الهيدروكلوريك والحمض
 النيتريك وماء الذهب فتستعمل حسب ترتيبها المذكور اي الماء
 اولاً مطرداً وان لم تذب المادة فيه تنقل منه الى الحمض

الهيدروكلوريك وان لم تذوب في هذا فالى الحامض النيتريك ومنه الى ماء الذهب فاذا وجد فضة او رصاص في المادة بالفحص المنقي لا يسوغ استعمال الحامض الهيدروكلوريك بل يستعمل لذلك حامض نيتريك بعد استعمال الماء ولا بد من سحق المادة سحقاً دقيقاً قبل استعمال للتذويب

في التذويب بالماء

(١٦٢) خذ قليلاً من المادة المسحوقة واغلبها مع عشرة اضعافها ماء في انبوبة فان حدث فوران فافحص الغاز الصاعد على الكيفية المذكورة بند ٩٩ الى بند ١٠٥ وان ذابت المادة تماماً فتذويبها هو الماء فتذوب المادة كلها به فيكون الحاصل معداً للفحص حسب بند ١٨٢

واذا لم تذوب تماماً بعد غليان طويل فرشح قليلاً من الماء وجففه بجمارة قليلة على قطعة پلاتين نظيفة فاذا لم يبق شيء على السطح فالمادة لا تذوب في الماء البتة فيستعمل مذوب آخر واذا بقي شيء على السطح دل على ان البعض قد ذاب فخذ ما يلزم من المادة للفحص واغلبه في ما يكفي من الماء ورشح فيكون ما قد ذاب في المرشح والمرشح معداً للفحص

في التدويب بالحمض الهيدروكلوريك

(١٦٣) خذ قليلاً من المادة غير الذائبة واغلبها في حامض هيدروكلوريك مخفف (الأ إذا وجد بالفحص الاستعدادية ان المادة تحتوي على ازيق او فضة فتدوب بالحمض النيتريك بند (١٦٤) فان لم تذوب فيه فاغلبها في الحمض الهيدروكلوريك الثقيل ثم في حامض هيدروكلوريك مخفف فاذا حدث فوران فافحص الغاز الصاعد بند ٩٩ الى ١٠٥ فاما ان تذوب او لا فان ذابت تماماً فتدوبها هو الحمض الهيدروكلوريك فتدوب المادة كلها به فيكون المذوب الحاصل معداً للفحص وان لم تذوب تماماً فحفف قليلاً من الحمض على قطعة پلاتين واذا بقي شي لا او اذا لم يبق افعال كما فعلت في التدويب بالماء

في التدويب بالحمض النيتريك

(١٦٤) اذا لم تذوب المادة في الماء ولا في الحمض الهيدروكلوريك او ذاب قليل منها فقط فيها فخذ قليلاً من المادة الاصلية واغلبه في حامض نيتريك فان ذاب اولم يذوب فافعل كما فعلت قبلاً في التدويب بالماء وان بقي بعد ذلك ما لا يذوب البتة في الحمض النيتريك فاضف الى الحمض اربعة اضعافه من الحمض

الهيدروكلوريك لتوليد ماء الذهب واغلي المادة فيه. وان بقي شيء
غير ذائب فرشح السبال واخص المرشح على الطريقة القانونية
بند ١٨١٢ واخص ما لم يذوب على ما سبق ذكره في فحص المواد التي
لا تذوب في الحوامض بند ١٦٥

اما الاستعمال المتدوبات الاربعه فهو غير اعتمادي غير ان
الاكثر استعمالا لآيينها هي الماء والحامض الهيدروكلوريك ودونهما
الحامض النيتريك وماء الذهب في الاستعمال الآتي فحص
المعادن كما تقدم في بند ١٤٥ الى بند ١٤٨

في المواد التي لا تذوب في الماء ولا في الحوامض

(١٦٥) لقد سبق القول عن كيفية تدويب المواد التي تذوب
في الماء والحوامض سواء كانت معدنية او غير معدنية. اما بعض
المواد فلا تذوب في الماء ولا في الحوامض وهي كبريتات كل من
الباريوم والسنرونتيوم والرصاص وكلوريد الفضة والاكسيد
الالومينيك والاكسيد الكروميك والثاني اكسيد القصدير
والحديد الكرومي (وهو معدن طبيعي) وبعض الالومينات
والسيلكا واكثر السليكات والفلووريد الكلسيك. واما غيرها
كالكبريت والكربون فلا يذوبان وانما يكشف عنهما بفحص

البوري

اعلم المباد التي لا تنسب في المذوّبات المذكورة أنّها قد تفحوّل
الى مواد قابلة الذوبان باتحادها مع بعض المواد بواسطة حرارة
عالية فنحس باعتمادها قبل ذلك بالمكربسكوب اذا لزم ليتأكد اذا
كانت من مادة واحدة ولون واحد او مزيجاً من مواد متعددة
والوان مختلفة

في تحقق وجود الفضة والرصاص والتصدير

او عدم وجودها

(١٦٦) يكرر الفحص المنقي بالبوري باعتماد عظيم مع الالفتات
الخصوصي للفضة والرصاص والتصدير لانه من الممكن وجودها
الآن ولن لم نقدر على وجودها قبلاً اذا كانت المادة مزوجة مع
غيرها بخلاف ما هي عليه في الحالة الحاضرة . على انه لا حاجة
الى تكرار العمل اذا وجدت المواد المذكورة في فحص سابق . وقد
يجد ان العناصر المعدنية تكون قليلة بهذا المقدار حتى انها
لا تجمع على هيئة كرية فننظر . ولدفع هذا المحذور رطب الثقب
الموجود في الفحم بعد اتمام الاصحار واحفر الفحم حول الثقب حتى
تستخلص قطعة الفحم التي تحتوي على الثقب وما فيه سالمة ثم انقلها
الى هاون صيني واسحقها واغسلها باعتماد على نوع تستفرد به
الاجزاء الخفيفة فيبقى في الهاون ان وجد شي مما من معدن قابل

التطرق يُعرف بلونه ولمعانه وقد لا يرى سوى خطوط صغيرة معدنية ملتصقة بالهاون او بمدقته ثم اغسل الهاون والمدقة بماء الذهب لازالة كل ما يجعلنا في ريب وقت فحص آخر

في تحقق وجود كبريتات او عدم وجوده

(١٦٧) استحضر كمية من مزيج المادة غير قابلة الذوبان مع

الكربونات الصوديك وقليل من الفحم المسحوق واصهر المزيج على قطعة فحم بلهيب البوري المحلل ثم جرد المادة المصهورة مع ما حولها من الفحم كما سبق القول وضعها على صفيحة من الفضة بهيئة الدراهم ورطبها بنقطة ماء فاذا بقي اثر مسمر على الفضة دل على وجود الكبريتيد الصوديك الناتج من انحلال كبريتات ومنه يُستنتج وجود كبريتات في المادة تحت الفحص وفضلا عن ذلك تفوح رائحة الهيدروجين المكبرت عند اصهار مادة تحنوي على كبريتات فيعلم وجوده منها ثم تُنظف الفضة بعد استعمالها بواسطة السيانيد الپوتاسيك

في تحقق وجود الكروم او عدم وجوده

(١٦٨) اثن طرف شريطة من پلاتين واحم بلهيب البوري

الى درجة البياض ثم ادخله في مسحوق البورق فيلتصق به بعضه واحم الشريط ثانية حتى يصير البورق شفافا كالزجاج . اجعله

ان يلامس المادة تحت الفحص حتى يلتصق به قليل منها واحم هذا القليل بلهيب البوري الموكسد فاذا ذوّبهُ البورق وتولد لون اخضر مصفر في حالة البرودة دلّ على وجود الكروم. كرر الإحماء بلهيب البوري الداخلي فان تولد لون اخضر لامع وهو حامٍ ودام اللون على حاله وهو بارد فلا ريب اذ ذاك بوجود الكروم. واذا التصق كثير من المادة بالبورق فقد يحدث ان البورق يصير غير شفاف فيلزم اذ ذاك ان تزد كمية البورق بند ١٤١ لتظهر شفافته فيرعى اللون فاذا وجد كروم فلا يمكن ان تعرف مادة اخرى من لونها بالتمام وان لم يوجد فيمكن ان يُفحص عن الحديد في البورق لان اكسيد الحديد يلون البورق بلهيب البوري الموكسد بلون احمر وهو حامٍ واصفر وهو بارد ويلونه اللهب المحلل بلون اخضر او اخضر مسمر بند ١٤٢

في تحقق الفلوراو عدم وجوده

(١٦٩) يكشف عن الفلورا كما ذكر في بند ١١٤

(١٧٠) وبعد استعمال هذه الكواشف الاربعة ووقوفنا على

عدم وجود المواد التي يكشف بها عنها يبقى علينا للفحص الومينا وبعض الالومينيت والسليكا وبعض السليكات واذا وجدت المواد التي استعملت هذه الكواشف لاجلها وكانت المادة بسيطة

يُستنتج من ظواهرها تركيب المادة تحت الفحص وبقي بعد ذلك طريقتان لتغيير المادة غير قابلة الذوبان الى احوال يمكن فيها الفحص عنها بسهولة. اما الطريقتان فهما الطريقة بالاصهار والطريقة بالاحراق

الاصهار

(١٧١) امزج مسحوق المادة تحت الفحص بستة اضعافها وزناً من مسحوق الكربونات الصوديك الناشف بشرط ان يكون المسحوق في غاية ما يكون من الدقة وممزوجين مزجاً تاماً واحم المزيج في بوظقة پلاتين (او بوظقة صينية اذا وجد معدن ما يقبل الاصهار كالفضة والزئبق والرصاص في المادة) الى درجة الحمرة وابق الحرارة حتى يذوب تماماً ثم اتركه ليبرد

(تنبيه. اذا ظن من الفحص او من ظواهر المادة انه يوجد فيها حديد كرومي يستعمل مزيج من الكربونات الصوديك والنيترات الپوتاسيك اجزاء متعادلة عوضاً عن الكربونات الصوديك وحده) (١٧٢) وبعد ما يبرد المزيج المصهور ذوبه في ماء غالي حتى يذوب كل ما فيه يقبل الذوبان ورشحه واحفظ المرشح للفحص القانوني عن السائلات بند ١٨٢ ثم خذ ما لم يذوب في الماء وذوبه في الحامض (الحامض الهيدروكلوريك ان لم يوجد فضة او رصاص

والحامض النيتريك اذا وُجِدَا او وُجِدَا احدهما فقط) فاذا بقي ما لا يذوب في الماء ولا في الحامض اما ان يكون حامضاً سلسيكاً او مادة تبقى غير محللة بالاصهار فان كانت هي الاخيرة فلا بد من تكرار الاصهار والعمل المذكور

ولتعرف كيف يتصرف بما ذاب في الماء وما ذاب في الحامض افرض ان المادة هي الكبريتات الباريك فحدث تغيير بين الكبريتات الباريك والكربونات الصوديك عند درجة الحرارة العالية حتى بقي الكربونات الباريك والكبريتات الصوديك (باك ا_٤ + ص كرام = ص ك ا_٤ + با كرام) فيذوب الكبريتات الصوديك في الماء والكربونات الباريك الذي لا يذوب في الماء يذوب في الحامض الهيدروكلوريك او النيتريك على هيئة كلوريد او نتراتيه . او افرض ان المادة تحت الفحص هي السليكات الكلسيك والالومينوم فبعد اصهارها مع الكربونات الصوديك وتذويبها في الماء والحامض يبقى في المذوب المائي بعض السليكات على هيئة السليكات الصوديك والبعض يبقى في المذوب الحامض والبعض الآخر لا يقبل الذوبان ويبقى بعض الالومينوم في المذوب المائي على هيئة الالومينات الصوديك ويبقى البعض الآخر في المذوب الحامض على هيئة الكلوريد

الالومينيك وما بقي من الحامض السليسيك يبقى غير ذائب. فمن
المقالين المتقدمين تظهر التغيرات التي تحدث في الاصهار فلتتقدم
الآن للبحث عن الكيفية المستعملة بعد الاصهار

(١) (١٧٣) حمض قليلاً من المذوب المائي واستخدام الكشف
بالباريوم للكبريتات مع تحقق عدم وجود كبريتات في الكربونات
الصوديك المتخذ للاصهار

(ب) حمض كمية اخرى بحامض خليك واستخدام الكشف
بالرصاص للكرومات كما ذكر في بند ٥٢ فاذا وجد في السيل
حامض كبريتيك يخفي نوعاً ما يتبع عن الكاشف ولكنه لا يعد منا
معرفة

(ت) حمض كمية اخرى بحامض نيتريك واستخدام الكشف
بالفضة للكلمور مع تحقق عدم وجود كلوريد ما في الكربونات
الصوديك المستعمل في الاصهار

(ث) جفف كمية اخرى في صحن صيني وبردها وحمضها
بحامض هيدروكلوريك وانتركها هادئة حتى يفلت الحامض
الكربونيك ثم اضف اليها ماء النشادر بزيادة واحمها ورشها وهي
حامية واجمع المرشح في قنينة واضف اليها الكلوريد الكلسيك
ثم سد القنينة وانتركها ليهدأ ما فيها. فاذا وجد فلوريد في المادة

تحت الفحص ينتركب الفلور مع الصوديوم وقت الاصهار ويبقى
 الفلوريد الصوديك في المذوب المائي وبعد ما يزال الحامض
 الكرونيك وكل المواد التي ترسب بماء النشادر يرسب الفلوريد
 الكلسيك بواسطة الكلوريد الكلسيك . فاذا تولد راسب في
 المذوب داخل القنبينة يجمع ويجفف ويغصص على الكيفية المذكورة
 بند ١١٤

(١٧٤) اذا تحقق عدم وجود ما يفحص عنه بالكواشف
 الاربعة المشار اليها انفا او اذا تحققت بكواشف اخرى عدم وجود
 الكبريتات والكرومات والكلوريد والفلوريد فاضف ما بقي من
 المذوب المائي للمذوب الحامض وجففها واحرقها ثم اغل ما يبقى
 بالحامض الهيدروكلوريك او النيتريك المخفف فان لم يذب تماما
 يكون ما لا يذوب حامضا سلسيكا . افحص عن المذوب بالكيفية
 الاعيادية كما ذكر بند ١٨٤ متذكرا اضافة الصوديوم والپوتاسيوم
 في بعض الاحوال (اي لا يمكن هنا الكشف عن الصوديوم
 والپوتاسيوم لاننا استعملناها)

(١٧٥) واذا كانت الكواشف الاربعة تبين وجود ما يكشف
 بها عنه فحمض المذوب المائي بحامض هيدروكلوريك ثم جففه
 واحرقه واغل بالحامض الهيدروكلوريك المخفف فيكون ما

لا يذوب حامضاً سليكياً. انحص في المذوب عن العناصر المعدنية بند ١٨٢ وما يتلوهُ. فاذا وُجد حامض سليسيك فجنف المذوب الحامض واحرقهُ واضف للباقي حامضاً مخففاً ورشحه وانحص في المرشح عن العناصر المعدنية. وكثير من العناصر المعدنية يتركب مع الحامض السليسيك على هيئات متعددة فلذلك جنف المذوب الحامض ليصير السليكا غير قابل الذوبان حتى يمكن ان يستفرد بالترشيح لانه ان لم ينفرد يظهر في كل آن كراسب مولداً ارتباكاً وريباً. اما بعض السليكات فيجنوي على صوديوم وپوتاسيوم ولذلك يتعذر استعمال الكربونات الصوديك للاصهار فتستعمل له مادة اخرى كما سيأتي

في الاصهار بواسطة الكربونات الكلسيك والكلوريد الامونيك

(١٧٦) امزج جيداً جزءاً من السليكات الكلسيك وستة اجزاء من الكربونات الكلسيك الصافي وثلاثة ارباع الجزء من الكلوريد الامونيك المسحوق واحم المزيج الى درجة الحمرة في بوتقة پلاتينية مدة ٢٠ او ٤٠ دقيقة وضع البوتقة في صحن بجنوب على ماء غال واتركهُ مدة نصف ساعة على درجة الحرارة ذاتها ثم رش

المدوب فيكون في المرشح كلس كايو والكلوريد الكنسيك وكل
 الصوديوم والپوتاسيوم الموجود في المادة تحت الفحص على هيئة
 كلوريدها. اضف للمرشح ماء النشادر والكاربونات الامونيك
 بزيادة ثم اغل المزيج ورشحه وجفئه واحرقه بلطافة حتى تزال منه
 املاح الامونيك. ذوب المزيج بقليل من الماء واضف نقطة او
 نقطتين من الكربونات الامونيوم ونقطة من الاكسالات
 الامونيك واحم المزيج ورشحه ثم جفف المرشح الخارج واحرقه فيكون
 الباقي اذا بقي شيء الا الكلوريد الصوديك او الكلوريد الپوتاسيك
 او كليهما معاً ويفحص عنه بالطريقة المذكورة وجه ١٠٦

في الاصهار بالكبريتات الصوديك الحامض

(١٧٧) ان الكيفية الآتية تستعمل للفحص عن اكسيد الحديد
 واكسيد الكروم والحديد الكرومي وبعض السليكات العسرة
 الفحص وهي
 احم المادة تحت الفحص مع ثلاثة او اربعة اضعافها من
 الهيدروكبريتات الصوديك في بوظقة پلاتينية حتى يذوب
 الكبريتات ثم ابقه في حالة الذوبان نصف ساعة والبوظقة مغطاة
 وعامل الباقي حسبما ذكر بند ١٧١

في الاحراق

(١٧٨) ان كيفية الاصهار السابق ذكرها تحتاج الى بوظقة بلاتينية اوصينية وحرارة عالية ولا حاجة لذلك في الاحراق الذي يدخل الحرارة الى ما داخل المادة فالكيفية لذلك هي كما ياتي .
 امزج جزءا بالوزن من المادة تحت الفحص مزيجاً جيداً مع جزءين من الكربونات الصوديك الناشف وجزءين من مسحوق الفحم نقياً دقيقتاً واثنى عشر جزءاً من النيترات الپوتاسيك المسحوق وضع المزيج في صحن صيني او حديدي نظيف ثم ضع الصحن في الخلاء تحت غطاء واشعل المزيج فيحترق في ثانيتين او ثلاثة خذ ما بقي واغله بماء محركاً اياه حركة دائمة فيذوب منه كل ما يقبل الذوبان في بضع دقائق وافعل بما لا يذوب كما فعلت في بند ١٧٢ ففوائد هذه العملية هي كونها سريعة رخيصة تحتاج الى آلات اغنيادية فقط غير انها لاتستعمل في الفحص عن الصوديوم او

الپوتاسيوم او الحديد

الكروي

الفصل الرابع

في فحص السائلات الاستعدادي

(١٧٩) جفف قسماً من السائل على قطعة بلاطين بجمارة لطيفة فاذا لم يبقَ باقي فالارجائه ماءً صرف ويؤكد ذلك اذا لم يفعل في ورق الكشف

واذا بقي شيء بعد تخفيف السائل تطاير تماماً عند ازدياد الحرارة فالمواد التي يمكن حضورها فيه هي الامونيوم والزرنيق والزرنيخ والكبريت فقط

وان لم يتطاير مطلقاً او تطاير جزئياً فلا يخلو من حضور مواد آخر غير هذه فيه. وعلى كلا الحالين يقتضي اجراء العملية الآتية

في السائل المتعادل

(١٨٠) اذا كان السائل متعادلاً فعدد كثير من المواد يكون مختلفاً غالباً لان الاملاح المتعادلة والقابلة الذوبان لاكثر المعادن هي تولد مذوبات حامضة. والاملاح التي تولد مذوبات متعادلة

هي املاح الفضة والمغنيسيوم القابلة الذوبان وبعض املاح البوتاسيوم والصوديوم والامونيوم والباريوم والسترونتيوم والكلسيوم والمغنيسيوم. فلذلك لا يكون في المذوب الا بعض املاح هذه المعادن . ولزيادة التمييز بينها اضف الهيدروكبريتيد الامونيك الى قسم من المذوب فاذا لم يولد راسباً كان المنغنيس والفضة غائبين ثم اضف مذوب الكربونات الصوديك الى قسم آخر من السيل واغله فاذا لم يولد راسباً ايضاً فمعادن الباريوم او السترونتيوم او الكلسيوم او المغنيسيوم غائبة والحاضر انما هو البوتاسيوم او الصوديوم او الامونيوم. واذا لم يولد الهيدروكبريتيد الامونيك راسباً وولد الكربونات الصوديك يقتضي الفحص عن الباريوم والسترونتيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والامونيوم . واذا ولد كل منها راسباً يقتضي الفحص عن كل المعادن المذكورة المتعادلة املاحها

اضف الى السيل في حالة كهذه حامضاً هيدروكلوريكاً وفرق الفضة بالترشيح ثم اضف الى المرشح ماء النشادر والكلوريد الامونيك والهيدروكبريتيد الامونيك فان تولد راسب فرشح وافحص في المرشح عن عناصر الصف السادس والسابع على الكيفية المعهودة

إذا حضر الباريوم او المغنيسيوم او الفضة في السيل المتعادل
فالحوامض الحاضرة قليلة لان كثيراً من املاح تلك المعادن
لا يقبل الذوبان في الماء وبعض املاح الباريوم التي تقبل الذوبان
فيه هي قلوية لورق الكشف

في السيل الحمض

(١٨١) اما ان تصدر حموضته عن حضور حامض بسيط
مطلق او ملح حامض او ملح متعادل له فعل حامض وهو مذوب
ويقتضي لمعرفة ردها الى الاصل الذي صدرت عنه ان يوضع
طرف قضيب زجاج مبلل بمذوب الكربونات الصوديك في قسم
من السيل موضوعاً في انبوبة فاذا تكدر السائل وبقي مكدراً
فاصلها حضور ملح متعادل واذا اصفي فاصلها اما ملح حامض او
حامض مطلق بسيط . فلا يكون في المذوب الحامض كربونات
ولا كبريتيد . واما الحوامض فتفحص بحسب بند ٢١٢ اذا كان ملحاً
متعادلاً له فعل حامض وبحسب بند ٢١٢ اذا كان ملحاً حامضاً
او حامضاً مطلقاً بسيطاً

في المذوب القلوي

(١٨٢) اما ان تصدر قلويتها عن كربونات او سليكات او

بورات او كبريتات فلووية واما عن حضور المغنيسيوم او البوتاسيوم او الصوديوم او الكالسيوم او الباريوم او الامونيوم او عن مركباتها مع السيانوجين او الكبريت . فاذا صدرت عن الامونيا او كربوناتها فعدد غفير من المواد (وهي التي لا تذوب عند حضور هذه المواد) غائب واذا صدرت عن حضور القلويات الثابتة او عن كربوناتها فعدد اعظم من الاول يكون غائباً او عن كبريتيد عنصر من عناصر الصف السادس والصف السابع من المواد غير المعدنية فكل المعادن التي لا يذوب كبريتيدها في الماء والكبريتيدات القلويات غائبة. الفحص المواد المعدنية على الكيفية المعتادة ملتفتاً الى التحذيرات التي تاتي عليك بند ١٨٤ و ١٨٥ ثم ابدا الفحص الجوامض بجعل المذوب متعادلاً بواسطة الحمض النيتريك فان لم يتولد راسب عند ذلك فافحص المذوب بحسب بند ٢١٤ والاشارة فرشح وافحص المرشح حسب بند ٢١٤ وتصرف في الراسب حسب بند ٢١٢

(تنبيه . على الطالب ان يبق جانبا من المذوب بدون

استعمال لقضاء حاجة اذا عرضت او لزيادة

(التحقيق)

الفصل الخامس

في الفحص عن المواد غير المعدنية في المادة المجهولة.

(١٨٣) بعد الفحص الاستعدادي وتذويب المادة إذا كانت جامدة تفحص في السائل عن المواد المعدنية

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن الصف الأول

(١٨٤) قبل اضافة الحامض الهيدروكلوريك الى المذوب تحت الفحص يقتضي ان يُحَقَّقَ باوراق الكشف اذا كان المذوب حامضاً او متعادلاً او قلوياً فاذا كان واحداً من الاولين كفي غالباً ان يُضاف اليه نقط قليلة من الحامض لان القصد الوحيد من اضافته هو تجميع المذوب لمنع ارساب الصف الرابع والصف الخامس مع الصف الثاني حينما يستعمل الهيدروجين المكثرت وان كان قلوياً يضاف اليه حتى يصير السائل حامضاً فاذا تولد راسب فاضف الحامض نقطة فنقطة حتى يكف عن الزيادة ثم اضف نقطةً اُخرَ قليلة منه وهز المزيج ورشحه واذا تولد غاز عند

اضافة الحامض فافحص عن الحامض الكربونيك والهيدروجين
المكبرت والسيانوجين على ما اشرنا في الكلام عنها . ثم اذا تولد
راسب الفضة بموجب الجدول على وجه ٢٩

(١٨٥) ولما كانت الفضة لا تولد راسباً مع حامض هيدروكلوريك
في بعض الاحوال وكان من المحتمل رسوب راسب عند اضافة
الحامض حتي ولا توجد مادة من مواد الصف الاول يقتضي ان
يلاحظ اولاً المادة التي تعارض رسوب الفضة . وثانياً المواد التي
يُحتمل رسوبها والاحوال التي تسبب رسوبها

فاذا كان النترات الزبيتيك حاضراً في المذوب فان
حضرت الفضة لا يرسب راسب بواسطة الحامض الهيدروكلوريك
لان الكلوريد الفضيك يذوب في مذوب فيه النترات الزبيتيك
ولا سيما اذا كان المذوب حامياً ثقيلاً وعند اضافة الماء والتبريد
قد يرسب في المذوب بلورات لامعة بيضاء مصفرة وهي الكلوريد
الفضيك صرفاً واذا اشتبه بوجود النترات الزبيتيك يضاف
الخلات الامونيك الى المذوب بعد اضافة الحامض الهيدروكلوريك
لان ذلك يؤكّد كمال رسوب الفضة

وقد يرسب الراسب من حضور ملح من املاح الاتيمون او
الزموث التي تتحلل بماء كثير الى حامض قابل الذوبان واملاح

غير قابلة الذوبان وقد يرسب الحمض السليسيك لحضور سليكات قلوي

فاذا تولد الراسب من حضور الاتيمون او البزموت يدوب ثانية عند اضافة نقط قليلة من الحمض الهيدروكلوريك وانما اذا كان حاضراً السليسيك يظهر لزجاً جداً ويبقى غير ذائب عند زيادة الحمض الهيدروكلوريك عليه. فلذلك يُحمّض قسم جديد من المذوب الاصلي بحامض نيتريك ويُخفف بالجزء لجعل الحمض السليسيك غير قابل الذوبان. ثم يُغلى الباقي في حامض نيتريك مخفف ويُرشح ويُفحص المرشح على الطريقة القانونية باضافة الحمض الهيدروكلوريك اليه وهلم جرا

واذا تولد راسب من حضور مادة اخرى يؤخذ قسم جديد من المذوب الاصلي ويضاف اليه الحمض النيتريك حتى يُحمّض فان لم يذب الراسب عند اضافة الحمض يُسخن المذوب واذا لم يذب بهذا ايضا يُفحص عنه كما يُفحص عن المواد التي لا تقبل الذوبان في الماء ولا في الحوامض بند ١٦٥

واذ كانت رواسب الصف الاول ثقيلة جداً فهي تنفصل عن المذوب بسهولة فلا لزوم الى تسخين السائل لاتمام ذلك لابل ينبغي العدول كلياً حذراً من ان يتحول جانب من الكلوريد الزبيقوس

الى الكلوريد الزبيقيك ويندوب بجانب الاعظم من الكلوريد
الرصايك اذا لم يذب كله

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن الصفيين
الثاني والثالث

(١٨٦) قبل امرار الهيدروجين المكبرت في المذوب يتنضي
ان يتخفف بما اذا كان حامضاً جداً لان عناصر هذين الصفيين
لا ترسب حالاً من مذوبات حامضة جداً
فلذلك اذا لم يكن المذوب قد تخفف وكان الكدميوم موجوداً
يمكن ان يرسب راسب اصفر عند اضافة الكبريتيد الامونيك
لرسوب الصف الرابع حتى ولو لم يرسب شيء بالهيدروجين
المكبرت

(١٨٧) ويُعتبر انه اذا لم يجعل المذوب حامضاً بالكفاة فقد
يمكن ان يرسب بعض الزنك (اذا كان حاضراً) مع الصف الثاني
باضافة الهيدروجين المكبرت

ثم اذا تكدر السائل عند تخفيفه وذلك من حضور ملح من
املاح الاتيمون او البزموت فان اضيف اليه نقط قليلة من الحامض
يندوب الراسب ثانية


(١٨٨) ثم ان الحامض الزرننجيك يرسب بمهل زائد بالهيدروجين المكثرت. فاذا اذا كان الزرنج حاضراً او اشتبه بحضوره يجب انفاذ الهيدروجين المكثرت في السيال مدة ساعات او يغلى السيال ويُشَّحَّ وَيُقَسَّم الى اقسام لاجل الامتحان بالطرق الآتية

طريقة رينش

(١٨٩) حمض السيال تحت الفحص باضافة حامض هيدروكلوريك اليه ثم اغلوه مع بعض القطع من ورق النحاس الصفر المصقول اللامع فان كان الزرنج حاضراً يجمع على النحاس اغسل النحاس ونشفه واطوه وضعه في انبوبة طويلة من الزجاج البوهيمي مفتوحة الطرفين ثم احمه بتدليل الكحولي واجعل الانبوبة مائلة على سطح الافق فيتاكسد الزرنج ويتصعد ويجمع في جزء الانبوبة البارد على هيئة بلورات حامض زرننجوس

طريقة مارش

(١٩٠) استحضّر آلة كما المرسومة في شكل ١٤



شكل ١٤ وضع في الساق الاقصر قطعة زنك صرف ثم اضع اليه الحامض الهيدروكلوريك الصفر حتى يملأ نصف الساق الاقصر ثم اضع اليه السيال تحت الفحص فان كان الزرنج حاضراً

يتولد هيدروجين مزرنيخ . اشعل الغاز وهو خارج من المحنفة واستلقِ لهبهُ على صحن صيني بارد فيجمع عليه الزرنيخ المعدني تنبيه . الانتيمون يجمع ايضاً على هذه الكيفية من الهيدروجين الانتيموني ولكن اذا أحمي الزرنيخ يتصعد ويزول واما الانتيمون فيثبت واذا عُرِض على لهيب البوري يتحول الى أكسيد الانتيمون الاصفر واذا بُرد يبيضُ . الزرنيخ يذوب في مذوّب كلوريد الكلس خفيف واما الانتيمون فلا يذوب فيه واذا ذوّب كبريت قليل في الكبريتيد الامونيك وأضيف الى الانتيمون يذوب واذا جفّف يبقى باقي برتقالي اللون اما الزرنيخ فلا يتاثر بذلك

(١٩١) وان لم يتولد راسب باضافة الهيدروجين المكثرت بالاحنيطات اللازمة يدل على عدم حضور الصف الثاني والثالث وان تولد وكان ابيض اللون يدل على عدم حضورها لان الراسب الابيض ينتج من انفصال الكبريت الذي يحصل عن التحلل الهيدروجين المكثرت . واذا تغير لون المذوّب الاصلي اي البرتقالي او الاصفر الى اخضر بعد مرور الغاز فيه فانفصال الكبريت ينتج عن تحويل كروم الى كروم ام وكثيراً ما يرتبك الطالب من وقوف الابيض في المذوّب الاخضر لظهوره في اول الامر مثل راسب اخضر واذا لم يتغير اللون عند انفصال الكبريت فذلك

(لعلة) من تحويل ملح حديدك الى ملح حديدوس
 (١٩٢) واذا تولد عند اول انفاذ الهيدروجين المكبرت في
 المذوب راسب ابيض ثم صار برتقالي اللون عند زيادة الكاشف
 ثم اسودَّ فهو دل على حضور ملح من الاملاح الزبيقيك واما اذا
 كان لونه احمر او احمر مسمرًا عند اول تولده وصار اخيراً اسود
 فهو دل على احتمال حضور ملح من املاح الرصاص وبعد ارساب
 كل ما يرسب بالهيدروجين المكبرت غسل الراسب جيداً
 (آخر بند ٢٢) واغله في الهيدرات الصوديك ورشحه ثم افحص ما
 لا يقبل الذوبان بموجب الجدول على وجه ٥٦ وما يقبل الذوبان
 بموجب الجدول على وجه ٧٠

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن الصف الرابع
 (١٩٢) اغل المرشح الباقي بعد تفريق الصف الثاني والثالث
 لطرده الهيدروجين المكبرت واضف اليه وهو غال قليلاً من
 الحامض النيتريك لتحويل الحديدان وجد الى ملح حديدك
 لو كان الهيدروجين المكبرت لا يطرده قبل اضافة الحامض
 النيتريك لكان هذا الاخير يؤكسد الكبريت مولداً الحامض
 الكبريتيك الذي يرسب البار يوم والسنترتيوم لو كانت حاضرة ولا بد
 ايضاً من طرد الهيدروجين المكبرت كله قبل اضافة ماء النشادر

ذوب رواسب الصف الرابع في حامض نيتريك مخفف غالباً

		في المرشح	
الأكسيد المحديدا	ذوب الراسب في	الأكسيد الكروميك	والأكسيد الألومينيك
		والنصفات "	والنصفات "
	في الراسب الآك	اغل المرشح مدة ورشح	
والكلسيوم المغنيز	الى المذوب النيز	حمض المرشح بحامض خليك بزيادة	ذوب الراسب في حامض
اجعل المرشح قلا	ورشح	هيدروكلوريك واضف اليه	ورشح
	الراسب	الخلاص الصوديك بزيادة	في المرشح
في الراسب	النصفات	فاذا تولد راسب فكان	الأكسيد
النصفاد	الألومينيك	النصفات الكروميك	النصفات
الزيفوس اغلا		حاضرًا رشح واضف الى	اضف اليه
الراسب		المرشح ماء النشادر فاذا	النصفات
الكبريتي		تولد راسب فكان الأكسيد	الصوديك
الامونيك ور		الكروميك حاضرًا	فيرسب
واكشف ء			النصفات
الحماض			الألومينيك
النصفوريك			
بند ١٠٨			

المدوب وهو بارد الهيدرات الصوديك حتى بصير قلوباً

في الراسب

الصفات كل من (ح) و(با) و(ست) و(كلس) و(م) والأكسالات كل من (با) و(ست) و(كلس) نتريك غال واضف الى المدوب حامضاً خليكاً ثم اجعله قلوباً بماء النشار

والنصفات كل من الباريوم والسترونتيوم ذوب الراسب في حامض نتريك واضف الزيفوس ورشح

حمض القسم اذا وجد الحديد
الاول بحامض في القسم الاول
خليك واضف اكشف عن
اليه الفروسيانيد الحامض
الپوتاسيك النصفوريك في
فاللون الازرق القسم الثاني
يدل على بموجب بند
الحديد ١٠٨

بماء النشار في الراسب الاكسالات
الزيفوس ولتحقق وجود
المرشح الحامض الاكسليك اغل
الراسب مع الكبريتيد
الامونيك ورشح. حمض
المرشح بحامض خليك
ورشح اذا اقتضى الحال ثم
اضف الى المرشح الكبريتات
الكسيك فاذا تولد فيدل
على حضور الحامض
الاكسليك ١٠٢

حتى اذا لم يَضَف الحامض النيزيك الى المذوّب ولم يكن الحديد
حاضراً أو ألا يتكوّن الكبريتيد الامونيك وبالتالي يرسب الصف
الرابع والخامس واذا كان المذوّب حاضراً جداً فلا حاجة الى
اضافة الكلوريد الامونيك لانه يتكوّن مقدار كافٍ منه عند
اضافة ماء النشادر الى السيل الحامض

(١٩٤) اذا كان كثير من الكروم حاضراً فكمية قليلة منه تذوب في
ماء النشادر وتكوّن السائل لونا احمر او قرنفلياً وعند ذلك يعسر
ان تُزال اثار الكروم الاخيرة من المذوّب فيسخن وان لم يند
التسخين فالاحسن قطع النظر عنه لانه اذا تجفّف المذوّب ترسب

كمية من اكاسيد المنغنيس والنكل والكوبلت اذا كانت حاضرة
(١٩٥) يُجمل ان الراسب المتولد باضافة ماء النشادر يحتوي علوة

على عناصر الصف الرابع على الاملاح الآتية وهي (ال) و(كرو) و(ح) و(من) و(با) و(ست) و(كلس) و(م) على هيئة فصائنها
و(با) و(ست) و(كلس) على هيئة اكسالاتها بند ٦٠ فعلى الطالب

اذا اقتضى الامر ان يفحص الراسب المتولد باضافة ماء النشادر في
تفتيشه بموجب الجدول على وجه ٢٠٠ عوضاً عن الجدول المذكور
في وجه ١٤ والأفصح فصلاً اعنيادياً

(١٩٧) ويُجمل ايضاً ان يرسب (با) و(ست) و(كلس)

مركبة مع الفلور او على هيئة بوراتها بكميات صغيرة. ولكن كان يبقى دائماً كمية كافية في المذوب وترسب مع صفوها في مجرى الفحص القانوني فلذلك لم ندرج هذه الاملاح في الجدول

(١٩٨) واذا وجد الحديد في المادة تحت الفحص يجب على الطالب ان يعرف اذا كان حاضراً في المادة الاصلية كملح حديدوس او ملح حديدك ويتم ذلك بالفريسيانيد البوتاسيك الذي يولد لوناً ازرق مع ملح حديدوس والفروسيانيد البوتاسيك الذي يولد لوناً ازرق مع ملح حديدك

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن الصف الخامس

(١٩٩) اذا حضر (كروم) و(با) في المذوب فقد تكون مادة لا تقبل الذوبان عند تدوير الراسب الذي يتولد باضافة ماء النشادر او الكبريتيد الامونيك والمادة هي الكبريتات الباريك والظاهر انه يتكون اكسيد كبريتي عند انحلال (كروم) بواسطة (H₂O₂) الذي يتحول الى الحامض الكبريتيك بعد مدة ويرسب الباريوم على هيئة كبريتاته

ان ترشح الراسب الذي يتولد بالكبريتيد الامونيك عسر جداً فان المرشح يبقى عكراً مدة ولا علاج لذلك الا ان يكرر الترشيح حتى يصفو تماماً وينبغي ان يميز بين المرشح العكر والصافي

الملون فان المرشحة تزبل من السائل ما امسكه كما في الاول ولا تزبل ما ذاب في الثاني . فاذا كان المرشح ملوناً فحصة كما في البند التالي ويجب ان يغسل الراسب باعنائها بما فيه قليل من الكبريتيد الامونيك لمنع تاكسد الكبريتيدات الراسبة فاذا صار ماء الغسل حينئذ ذا لون اسمر غامق فحصة كما في البند التالي

(٢٠٠) اذا كان المرشح الباقي بعد تفريق الصف الخامس ذا لون اسمر غامق جداً فذلك من حضور النكل لان كبريتيد ذلك المعدن يذوب قليلاً في الكبريتيد الامونيك وبعدهما يذوب قسم منه يحنف المرشح وماء الغسل ايضاً اذا كان غامق اللون حتى يطرد ما زاد من الكبريتيد الامونيك ثم يحمض المذوب بواسطة الحامض الهيدروكلوريك مخفف والراسب الذي ينفصل عند اضافة الحامض يجمع على المرشحة ويخص مع الذي جمع قبلاً فاذا لم يكن الكدميوم قد رسب تماماً بواسطة الهيدروجين المكثرت مع الصف الثاني فلون الراسب الذي يولده الكبريتيد الامونيك اصفر من حضور الكبريتيد الكدميك

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن الصف السادس (٢٠١) تجي المذوب بلطافة بعد اضافة الكربونات الامونيك ولكن لا يغلي لئلا ينحل الكلوريد الامونيك ويزوب بعض

الكاربونات الراسبية

(٢٠٢) ان الكاربونات الامونيك وان يكن لا يرسب الباريوم والسنرونتيوم والكلسيوم تماماً من مذوباتها ولا سيما اذا كانت كمية املاح الامونيوم الحاضرة كثيرة فهو كافٍ لاعمال التحليل الكيفي كلها ولا يكون تفريق تلك المعادن تماماً ما لاملاح الامونيوم من فعل التدويب ولا سيما في الكاربونات الباريك والكاربونات الكلسيك ويندر ان يرسب دقاق الباريوم والكلسيوم على هذه الكيفية فتفريق (با) انما يتم بواسطة الحامض الكبريتيك او كبريتات وتفريق الكلسيوم بواسطة الاكسالات الامونيك في حضور ماء النشادر او الكلوريد الامونيك وتفريق السنرونتيوم كتفريق الكلسيوم

في ما يجب الحذر منه في الفحص عن المغنيسيوم

(٢٠٣) اذا تخفف المذوب جداً في مجرى التحليل يزداد التأكيد في الكشف عن المغنيسيوم اذا تجفف المذوب قبل اضافة النصفات الصوديك وعلى كل حال لا بد من وقت كافٍ لتكوين الراسب كما وان المذوب يكون بارداً عند اضافة الكاشف اليه ويهز مراراً عديدة بعد اضافته ويضاف ماء النشادر بزيادة الى المذوب لانه اذا احتوى منه يذوب فيه النصفات المغنيسيك اقل مما في الماء الصرف

الفصل السادس

في الفحص عن المواد غير المعدنية

في المادة المجهولة

(٢٠٤) قد تقدم معانيان الفحص الاستعدادي والفحص عن المواد المعدنية في المادة المجهولة وهذان الفحصان يسبقان الفحص عن المواد غير المعدنية وذلك لان المواد غير المعدنية ليست منقسمة صنفياً والفحص عنها يكون بكواشف خصوصية يحكم عليها بما يستنتج من الفحص الاستعدادي والفحص عن المواد المعدنية ولذلك لا بد للطالب قبل استعمال الكواشف في الفحص عن المواد غير المعدنية ان يتذكر نتائج الفحصين المشار اليهما وهي اذا كانت المادة تسود او لا بعد احماؤها في الانبوبة واذا كانت تذوب او لا تذوب عند احماؤها ايضاً واذا كان يتصاعد عنها روائح خصوصية كذلك واذا كانت تذوب في الماء او الحوامض او لا تذوب فيها واذا كان مذوبها حامضاً او قلوياً واذا ذابت في الحوامض بنوران كما ترى في ما ياتي

في ما يستفاد من الاسوداد

(٢٠٥) اذا اسودت المادة بالحرارة يستدل على وجود مادة آليّة والمطلوب منها في هذا الكتاب هو السيانيد والأكسالات والطرطرات فهي ما يخص عنها (ويُعرف الطرطرات بانه ينجع عند اسوداده رائحة خصوصية كرائحة السكر المحروق) واذا لم تسود دلت على عدم وجودها فلا يكشف عنها

في ما يستفاد من الذوبان في الحرارة

(٢٠٦) واذا ذابت المادة في الحرارة دلت على وجود كلورات او نترات فينحص عنها والأفلاجج ان لا وجود لها واذا صعدت عنها روائح خصوصية فهي تدل على المادة الموجودة كدلالة رائحة البيض الفاسد على وجود كبريتيد ونحو ذلك
في ما يستفاد من معرفة المواد المعدنية اذا ذابت

المادة في الماء

(٢٠٧) واذا ذابت المادة في الماء يجب ان نذكر المواد المعدنية التي فيها لتعرف منها المواد غير المعدنية ويستعمل لذلك في الغالب كواشف قليلة فقط مثاله لنفرض ان المادة تحت

الفحص تذوب في الماء وتحتوي على سترونتيوم فلان ما يذوب من مركبات السترونتيوم في الماء هو كبريتيد السترونتيوم وكوريدو وبروميدو وبوديدو وسيانيدو ونتراتو وكوراتو واسيتاتو يفحص عنها فقط وتترك البواقي غير ان وجود السيانيد والنترات والكورات يعرف من الفحص بالحرارة كما ذكرنا فان لم يظهر واحد منها يفحص عن البقية

مثال آخر على افتراض ان المادة تحت الفحص تذوب في الماء وتحتوي على املاح زيفوس فتكون المادة اما كبريتات الزبيق او سيانيدو او كوراتو او نتراتو او اسيتاتو فاذا كان العنصر المعدني صوديوم او بوتاسيوم فقط وذاب في الماء يلزم الفحص عن ثلاثة عشر لمحا. فيظهر مما تقدم ان معرفة ذوبان المادة في الماء او عدم ذوبانها فيه لازمة جداً لتدل على المادة غير المعدنية بعد معرفة المادة المعدنية

في ما يُستفاد اذا ذابت في الحوامض فقط

(٢٠٨) ان لم تذب المادة في الماء بل ذابت في الحوامض يستتج من ذلك ما يعيننا في الفحص بعدما نتف على العناصر المعدنية الموجودة فيها مثالة

لنفرض ان المادة تحت الفحص لا تقبل الذوبان في ماء وتذوب في حامض هيدروكلوريك وعنصرها المعدني هو نكل فنعرف ان كبريتاته وكلوريدُه وبوراته وكروماته وبروميدُه ويوديدُه وكلووراته واستيائه ونيتراته تذوب في الماء فجميع هذه الاملاح تخرج عن الفحص فاذا كانت المادة كبريتيد النكل او هيبوكبريتيدُه او كبريتيدُه او كربوناته يكون قد كشف عنها عند تذويب المادة لانها تذوب بفوران بند ٩٩ واذا كانت المادة زرنجات النكل او زرنجيدُه يكون قد كشف عنها في الفحص عن العناصر المعدنية ويبقى علينا للفحص املاح النكل الآتية فقط وهي فصافه واكسالته او طرطراته اوسليكانه فيتضح ما ذكر من الامثلة ان معرفة قابلية المركبات للذوبان هي ذات مساعده كلية لنا لفحص على اي نوع من الاملاح يوجد امامنا ولذلك يقتضي للتحلل ان يعرف قابلية المركبات للذوبان وباي نوع تذوب ولزيادة

السهولة على الطالب قد

ادرجنا الجدول

الآتي

جدول بظہر

ک	ب	ز	غ	سکو	کرو	کلس	کد	بز	با	رر	انت	ن	ال	
ح	ح	ز	غ	سکو	کرو	کلس	کد	بز	با	رر	انت	ن	ال	اکسید
ح	ح	ح	ح	ح	ح	(م)	ح	ح	ر	م	ح	م	ح	اکسالات
ح	ح	ع	ح	ح	م	ح	ح	ح	ح	غ	غ	م	ح	برومید
ح	م	م	م	م	م	م	ح	(م)	م	ح	(م)	م	م	بورات
ح	ح	غ	ح	(م)	ح	(م)	ح	(م)	ح	غ	غ	م	غ	طرطرات
ح	(م)	غ	(م)	م	م	(م)	(م)	ح	ح	غ	م	م	م	خلات
ح	م	غ	م	م	م	م	م	م	م	غ	غ	م	م	زربخات
ح	ج	غ	ح	ح	ح	ح	غ	(ح)	(م)	غ	غ	م	ح	زربخیت
ح	ج	غ	ح	ح	غ	ح	غ	(م)	غ	غ	غ	م	غ	سلیکات
ح	لا	غ	ح	غ	غ	ح	غ	ح	ح	غ	غ	غ	(ح) لا	سیانید
ح	(ح)	م	ح	ح	ح	م	(م)	غ	(م)	غ	غ	م	غ	فلورید
ح	(م)	غ	ح	ح	م	لا	(م)	م	(م)	م	م	م	لا	فصفا
ح	ح	غ	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	غ	(م)	م	ح	کبریتات
ح	م	غ	م	م	م	(م)	م	ح	لا	غ	ح	م	م	کبریتیت
ح	(م)	غ	ح	ح	ح	(م)	ح	ح	ح	غ	غ	م	م	کبریتید
ح	ح	ح	ح	ح	غ	م	ح	ح	م	ح	ح	م	غ	کربونات
ح	ح	غ	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	غ	غ	م	غ	کرومات
ح	غ	غ	(م)	ح	ح	م	(م)	ح	ح	غ	ح	م	ح	کلورات
ح	م	غ	م	م	غ	م	م	غ	م	غ	غ	م	م	کلورید
ح	م	م	م	م	م	م	م	م	م	ح	م	م	م	نترات
ح	م	م	م	م	م	م	م	م	م	غ	غ	م	م	ہیپو کبریت
ح	م	غ	غ	م	غ	م	م	غ	(م)	غ	غ	م	غ	بودید
ح	ح	غ	غ	م	م	م	م	ح	م	(م)	ح	م	م	

	يك وس						يك وس							
	ن	م	من	زني	زني	تلك	بلا	ب	فض	ص	سس	ق	ق	زن
أكسيد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
أكسالات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
بروميد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
بورات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
طرطرات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
خلات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
زرنيخات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
زرنيخت	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
سليكات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
سوانيد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
فلوريد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
فصنات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كبريتات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كبريتيت	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كبريتيد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كربونات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كرومات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كلورات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
كلوريد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
نترات	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
هيدروكبريتيت	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح
يوديد	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح	ح

ايضاح كيفية استعمال الجدول

(٢١٠) تدل م في الجدول على ان المادة تذوب في الماء

بسهولة

وتدل (م) على ان المادة تذوب في الماء بصعوبة

وتدل ح على ان المادة تذوب بسهولة في الحوامض

و (ح) على ذوبانها بصعوبة في الحوامض

وتدل غ على عدم وجود المركبة او على انها قليلة الوجود

وتدل لا على عدم ذوبانها في الماء وفي الحوامض

بعد الوقوف على معرفة المادة المعدنية ومدوّبها فتش في

حقل تسميتها على مركباتها التي تذوب في هذا المذوّب وهي تُعرف

بحرف م او (م) او ح او (ح) ونحو ذلك مثالة لنفرض ان المادة

تحتوي على الفضة وتذوب في الماء بسهولة . فنرى في الحقل تحت

(فض) ان الحرف م يقابل الفلوريد والكلورات والنيترات

فلذلك المادة فلوريد الفضة او كلوراتها

او نيتراتها وقس

عليه

الفحص الاستعدادي للواد غير المعدنية

(٢١١) وإذا كانت المادة تذوب في الحوامض لا في الماء فتدل نتائج ذوبانها على وجود مواد غير معدنية أو على عدم وجودها مثال ذلك إذا ذُوب كربونات في حامض ما يفلت الحامض الكربونيك وإذا ذُوب كبريتيد فيه يفلت الهيدروجين المكبرت أو كبريتيت أو هيبوكبريتيت فالحامض الكبريتوس أو يوديد فبخار بنفسجي اللون ونحو ذلك . غير أنه إذا كانت المادة تحت الفحص تذوب في الماء فلا ينتج عنها ما تقدم ولذلك يفضل أن تفحص بالفحص الاستعدادي للواد غير المعدنية قبل استعمال الكواشف الخصوصية لها . ولذلك يحى قليل من المادة في انبوبة الى تحت درجة الغليان مع ثلاثة أو أربعة اضعافه من الحامض الكبريتيك الثقيل فاذا كان يوجد مادة غير معدنية قابلة للتطير يعرف وجودها من الغازات أو الابخرة المتولدة وهي الحامض الكربونيك من الكربونات يعرف من أنه عديم اللون والرائحة ومن فعله في ماء الكلس بند ١٠٠
الحامض الكبريتوس من الكبريتيت والهيبوكبريتيت يعرف برائحته بند ١٠٢ و ١٠٤

هيدروجين مكبرت من الكلوريتيد يعرف برائحته وبفعله في ورق مبتل بذبوب الرصاص بند ٥١ و ١٠٢

حامض هيدروكلوريك من الكلوريد يُعرف بأنه يهيج الرئتين اذا استنشق وبأنه يولد ابخرة بيضاء كثيفة اذا وُضع عليه قضيب زجاج مغموس بماء النشادر وجه ١٥٢ ب

بخار بنفسي من اليوديد يلون النشا بلون ازرق بند ١١٦

بخار احمر من البروميد يلون النشا بلون برتقالي بند ١١٥

بخار اصفر مخضر من الكلورات يتفرع بشدة بند ١١٨

في ما يُستفاد اذا كانت المادة تذوب في الماء

(٢١٢) اذا كانت المادة قابلة الذوبان في الماء ووجد في

الذوب واحد من عناصر الصف الاول من الحوامض او حامض كربونيك او هيدروجين مكبرت يجب ان يتخلص منه اولاً ثم

يجعل الذوب متعادلاً على ما تقدم بند ٩٧ ثم يفحص فيه عن

الحوامض الأخر كما سبقت الاشارة لذلك واذا لم يوجد فيه

حامض من حوامض الصف الاول ولا حامض كربونيك ولا

هيدروجين مكبرت فافحص الحوامض الأخر. وان كان الذوب

قلوياً فحمضه قليلاً بحامض نيتريك ثم باشر الفحص او كان حامضاً

كثيراً فقلل حموضته بماء النشادر ورشحه اذا اقتضى ثم افحص

في ما يُستفاد اذا كانت المادة لا تذوب في الماء

(٢١٢) واذا كانت المادة غير قابلة الذوبان في الماء وتذوب في الحوامض فالاحسن في الغالب ان يتخلص المذوب من كل المعادن الأ (ص) و (م) و (پ) فان حضور بعض من المعادن الأخر يمنع الكشف عن بعض الحوامض والتخلص منها يتم باحدى الطرق الثلاثة الآتية. وهي أولاً ان ترسب عناصر الصف الاول والصف الثاني والصف الثالث ان وُجدت في المذوب الحامض بواسطة هيدروجين مكبرت ثم رشح واغل المرشح بلطف حتى يطرد الزائد من H_2K ثم اضف مذوب الكربونات الصوديك (خالياً من الكبريتات والكلوريد) بكثرة ثم قليلاً من الكربونات الصوديك جامداً واغله مدةً ثانياً اغل الجامد الجاف بكثير من مذوب الكربونات الصوديك مثقلاً وابق الغليان مدةً ثالثاً امزج الجامد باربعة اجزاء من الكربونات الصوديك والنيترات البوتاسيك واصهر المزيج واغله بما هو على كل من هذه الطرق تبقى المواد المعدنية في الراسب وغير المعدنية في المذوب مركبة مع الصوديوم. فرشح واضف الى المرشح حامضاً نيتريكاً واحم المذوب بلطافة معتنياً بابقائه دائماً حامضاً حتى يطرد كل الحامض الكربونيك ثم اجعله

فلوياً قليلاً بماء النشادر واحم المذوب ثانية حتى يطرد النشادر
ويبقى المذوب متعادلاً فاذا تولد راسب فرشح وافحص المرشح
بند ٢١٤

(٢١٤) اكشف جانباً من المذوب بمذوب الكلوريد الباريك
او النترات الباريك بند ٩٥ واكشف جانباً آخر بمذوب
النترات الفضيكي بند ٩٧ ثم اكشف عن الحوامض التي تدل
عليها هذه الكواشف

فهرس

وجه	
١٧٦	التدويب بالماء
١٧٧	" بالحوامض
١٥٤ و ١٥٠	احماء المادة في الانبوبة المسدودة الطرف
١٥٧	" " على قطعة فحم وحدها
١٥٩	" " " " مع مادة اخرى
١٦٣	" " مع البورق
٢٦	ارساب الصف الاول من المواد المعدنية

وجه	
١١٠ و ٥٤	ارساب الصف الثاني من المواد المعدنية
١١٠ و ٧٠	" " " الثالث " "
٢٠٠ و ١١ و ٨٤	" " " الرابع " "
١١٢ و ٩٤	" " " الخامس " "
١١٢ و ٩٨	" " " السادس " "
١١٨	" " الأول من المواد غير المعدنية
١١٩	" " " الثاني " "
١٢٢	" " " الثالث " "
١٢٥	" " " الرابع " "
١٧١	ازالة مادة آية
١٨٨	الاحراق
١٨٢	الاصهار
٢٣	الصف الأول من المواد المعدنية
٤٢	" " " الثاني " "
٦٢	" " " الثالث " "
٧٦	" " " الرابع " "
٨٧	" " " الخامس " "
٩٧	" " " السادس " "
١٠٥	" " " السابع " "
١١٨	" " الأول من المواد غير المعدنية
١١٩	" " " الثاني " "
١٢٢	" " " الثالث " "
١٢٥	" " " الرابع " "

وجه	وجه	وجه
٢٩ و ٥٥	تفريق الصف الأول	اكسالات ٢٠ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠
١١٠	" الثاني "	الومهنوم ٢٠ و ٧٨
١١٠	" الثالث "	امونيوم ١٥٢
	تفريق الصف الثاني عن الصف	اتيمون ٦٦ و ٥٢ و ٥٨ و ٦٠ و ١٩٨
١١٠	الثالث	باريوم ٢٠ و ٥٨ و ٩٩
١١١	تفريق الصف الرابع	بروميدي ١٢٢ و ١٢٦
١١٢	" الخامس "	بزموت ١٦٠ و ٤٨
٢٨	تفريق عنصرين	بورات ١٢٠ و ١٢٢ و ١٢٢
٢٧	" مواد الصف الأول	بوري ١٤٢
٥٩	" الثاني "	پلائين ١٤٧ و ٧٤
٦٨	" الثالث "	پوتاسيوم ١٠٦ و ١٥٨
٢٠ و ٨٤	" الرابع "	تجنيف ١
٩٢	" الخامس "	تذويب بالماء ١٧٦
١٠١	" السادس "	" بالحوامض ١٧٧
١٠٩ و ٢١	" المواد المعدنية الى صفوف	ترشح ٢٢ و ١
١٥٧	تلوين لهيب القنديل	تسمية كيميائية ١٢
٢٩	جدول الصف الأول من المواد المعدنية	
٥٧ و ٥٦	" الثاني "	
٧١ و ٧٠	" الثالث "	
٢٠ و ٢٠ و ٨٥ و ٨٤	" الرابع "	
٩٤	" الخامس "	
١٠٢	" السادس "	
١١٥ و ١١٤	" الصفوف السبعة "	

وجه			
١٥٤ و ١٥٥	جدول الفحص البسيط بالحراة		
١٦٥	بالبورق	" "	
٢١٠ و ٢١١	قابلية المركبات للذوبان		
١٧٠	فحص الجواد الاستعدادي	٩	حامض خليك
١٨٩	" السائلات	٨	" كبريتيك
١٦٧	" المعادن	٧	" نيتريك
٢١٢	" المواد غير المعدنية	٦	" هيدروكلوريك
١٥٠	" انبوبة مسدودة الطرف	٢٠٠ و ٢٠٣	حديد
١٥٠	فحص بسيط	١٢٥ و ١٢٩	خلات
١٥٩	" منقي	٧٣ و ١٦٠	ذهب
١٦٣	" بالبورق	٢٤ و ٤٧ و ١٦٠ و ١٧٩	رصاص
١٦٦	" مادة مجهولة	٦٣ و ٥٣ و ٥٧ و ٥٨ و ١٩٧	زرنخ
١٩٣	" المواد المعدنية في مادة مجهولة	١١٨ و ١١٩ و ١٢٢ و ١٢٩	زرنخات
٢١٦	" " " " غير	١١٨ و ١١٩ و ١٢٢ و ١٢٩	زرنخيت
٢١ و ٢٠	فاحل عمومي	٢٦ و ٤٥ و ٥٤ و ٥٣	زيتي
١٤٦	فحم	٩٩ و ٥٨ و ٢٠٠	سترونيموم
١٥٨ و ١٢٠ و ٢٢٣ و ١٢٠	فصنات	١٢٠ و ٢٢٣ و ١٢٣	سليكات
١٧٩ و ٢٥ و ٢٠ و ١٦٠ و ١٧٩	فضة	٢٣ و ٢٧ و ١٥٢	سيانيد
١٨١ و ٢٤٤ و ٢٢٣ و ٢٠	فلوريد	١٩١	سيال حامض
١٢٦ و ١٤١	فوران	١٩١	" فلوئي
١٧٩ و ٦٧ و ١٦٠	قصدبر	١٨٩	" متعادل
١٥٧ و ٤٠ و ٥٢	كبريت	١٠٨ و ١٥٨	صوديوم
١٨٠ و ١٥٢ و ١٢٠ و ١٢٠	كبريتات	١٢٢	طرطرات

وجه	وجه	وجه	وجه
١٠	ماء النشادر	١٥٢ و ١٢٨	كبريتيت
٤	ماء منظر	١٥٧ و ١٥٢ و ١٢٨ و ١٢٢	كبريتيد
١٥١	مادة آليّة	١٢٧ و ١٢٤ و ١٢٠	كربونات
١٧١	ازالتها	٢٠٠ و ١٨٠ و ٧٧	كروم
٢٢	مرشحة	١٢٩ و ١٢٢ و ١١٩ و ١١٨	كرومات
٢٠٥ و ٢٠٠ و ١٠٦	مغنيسيوم	٥٢	كدميوم
٨٨ و ٨١	منغنيس	٢٠٠ و ١٥٨ و ١٠١	كلسيوم
١٦٠ و ١٥٨ و ٥٠ و ٢٨	نحاس	١٥٧ و ١٥١ و ١٢٨ و ١٢٠	كلورات
١٤٦	نفخ	١٢٥ و ١٢٢	كلوريد
٩١ و ٩٠	نكل	٩٢ و ٩٠	كوبلت
١٥٧ و ١٥٦ و ١٢٧ و ١٢٥	نيترات	١٤١	لهيب
١٢٩	هيبوكبريتيت	١٤٤ و ١٤٢	خارجي
١٠	هيدروكبريتيد امونيك	١٤٥ و ١٤٢	داخلي
١١	هيدرات صوديوم	١٤٥	محلل
١٥٢ و ٤٢ و ٩	هيدروجين مكبريت	١٤٤	مؤكسد
١٢٦ و ١٢٢	يوديد	٨	ماء الذهب
		١١	ماء الكلس

